

Información General:

APOLO® contiene extractos vegetales que estimulan el desarrollo radicular, mejoran el ambiente rizosférico para una mejor colonización, fortalece las paredes celulares e incrementa la tolerancia al ataque de hongos fitopatógenos.


Su contenido de microorganismos benéficos colonizan rápidamente las raíces de las plantas, protegiendo a esta mediante parasitismo, antibiosis, exclusión competitiva, resistencia sistémica y mejorando el mecanismo de defensa de la planta contra hongos fitopatógenos como *Fusarium sp*, *Phythium sp*, *Phytophthora sp*, *Rhizoctonia sp*, *Verticillium sp*, etc.

Composición Garantizada:

- *Bacillus subtilis*.....1x10⁸ UFC/g
- *Trichoderma harzianum*.....1x10⁷ esp/g
- *Trichoderma viridae*.....1x10⁷ esp/g
- *Streptomyces lydicus*.....1x10⁶ UFC/g
- Extractos Vegetales.....60.0 % P/P
- Silicio.....2 % P/P

Beneficios:

- Disminuye la incidencia y severidad de enfermedades causadas por hongos fitopatógenos.
- Incrementa la resistencia del cultivo al ataque de hongos fitopatógenos.
- Incrementa la tasa de germinación.
- Mejora el balance nutricional y la generación de biomasa.
- Es compatible con otros mecanismos de control para el diseño de programas técnicos.
- No genera resistencia en los hongos.
- Es ambientalmente seguro y su formulación



Recomendaciones de uso:

Cultivo	Dosis y Recomendación
Tomate, Tomate de Cascara, Chile, Bell Pepper, Berenjena	Se recomienda realizar aplicaciones de 1 a 2 Kg/ha a intervalos de 15 a 30 días, vía riego presurizado o drench desde la siembra o trasplante hasta mediados de la época de producción.
Sandía, Melón, Calabaza, Pepino	
Col, Brócoli, Coliflor	
Frambuesa, Fresa, Zarzamora, Arándano	En almacigo; se recomiendan 2 aplicaciones de 1 a 2 g/L de agua. La 1ª aplicación se realiza al humedecer el sustrato y la 2ª por inmersión de las charolas en la solución justo antes del trasplante.
Aguacate, Manzano, Guayabo, Durazno, Nogal, Café	
Papa	
Ornamentales	En frutales u ornamentales; se recomienda aplicar en el sistema de riego a intervalos de 15 a 30 días, durante las primeras 4 a 8 semanas después del periodo de brotación y hasta terminada la etapa de producción.
Quenopodiáceas	
Banano, Plátano, Cítricos, Piña, Papayo, Caña de azúcar	
Cebolla, Ajo, Zanahoria, Rábano, Esparrago	
Cacahuete, Algodón, Vid, Alcachofa, Lechuga	
Frijol, Garbanzo, Haba, Chicharo, Ejote, Soja, Maíz, Pastos	

**Intervalo de seguridad entre aplicación y cosecha: sin límite

Aplicación:

MÉTODO PARA PREPARAR Y APLICAR EL PRODUCTO: Se recomienda aplicarlo en riegos localizados, drench o con aspersor de mochila; procurando cubrir la zona radicular de la planta. Evite mezclar con fungicidas, bactericidas, fertilizantes, azufre o cal; o con equipos que presenten residuos de estos.

Para la inyección en el sistema, preparar una dilución mínima (1 kg en 50 L de agua) que asegure una aplicación uniforme en el sector de riego durante un tiempo de 15 a 30 minutos.

ADVERTENCIAS:

APOLO®, no debe aplicarse al mismo tiempo que los fertilizantes; **NO SE DEBE MEZCLAR** con ácido sulfúrico, amoníaco y sus derivados.

FITOTOXICIDAD:

APOLO®, no es fitotóxico a los cultivos aquí indicados y bajo la dosis recomendada.

RIESGOS:

Riesgos para las personas: **APOLO®**, es un producto no tóxico, no representa peligro de intoxicación, bajo condiciones normales de uso.

Riesgo para las abejas: Virtualmente no tóxico

Riesgo para las aves: Prácticamente no tóxico

Riesgo para los peces: No tóxico

La información contenida en esta Ficha Técnica, se proporciona con buenas intenciones, pero no constituye una garantía o compromiso de responsabilidad.