

ABAMECTINA + BIFENTRINA

Insecticida agrícola / Concentrado emulsionable

RSCO-HEDE-0221-0515-0424-80

D

COMPOSICIÓN PORCENTUAL

% EN PESO

INGREDIENTE ACTIVO:

ABAMECTINA: Mezcla de Avermectina B1a y Avermectina B1b (contenido no menos de 80% de avermectina B1a y no más de 20% de Avermectina B1b) (Equivalente a 2.99 g de i.a./L a 20 °C).....**0.34%**

BIFENTRINA: 2-metil-3-fenilbencil (1RS)-cis-3-(2-cloro-3, 3, 3-trifluoroprop-1-enil)-2,2- dimetilciclopropanocarboxilato. (Equivalente a 29.97 g de i.a./L a 20 °C).....**3.37%**

INGREDIENTES INERTES:

Emulsificantes y disolvente.....**96.29%**

TOTAL **100.00%**



**NOCIVO EN CASO DE INGESTIÓN
NOCIVO SI SE INHALA**

**“ALTO LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”
“INSTRUCCIONES DE USO”
“SIEMPRE CALIBRE SU EQUIPO PARA SU APLICACIÓN”**

INFORMACIÓN GENERAL:

BAVARON MAX es la mezcla de dos insecticidas que actúan por contacto e ingestión con acción traslaminar. Se recomienda para el control de la siguiente plaga y en los cultivos aquí indicados.

CULTIVO	PLAGA	DOSIS (L/ha)	OBSERVACIONES
Limonero (7)* Lima (7) Mandarino (7) Naranja (7) Toronjo (7) Tangerino (7)	Psílido Asiático de los Cítricos (Diaphorina citri)	1.0	Realizar dos aplicaciones al follaje, a intervalo de 7 días; volumen de aplicación 550-650 L de agua/ha.
Calabaza (7) Calabacita (7) Melón (7) Pepino (7) Sandía (7)	Mosca blanca (Bemisia tabaci)	1.5-2.0	Realizar una aplicación al follaje cuando se presenten los primeros individuos; volumen de aplicación 430-530 L de agua/ha.
Pepino (7)	Minador (Liriomyza sativae)	1.5-2.0	Realizar 1 aplicación al follaje, cuando se observen los primeros individuos de la plaga; volumen de aplicación 350-450 L de agua/ha.
Jitomate (7) Chile (7) Papa (7) Tomate de cáscara (7)	Mosca blanca (Bemisia tabaci)	1.5-2.0	Realizar una aplicación al follaje cuando se presenten los primeros individuos; volumen de aplicación 400-500 L de agua/ha.
Chile (7) Jitomate (7) Papa (14)	Ácaro blanco (Polyphagotarsonemus latus)	1.5-2.0	Realizar una aplicación al follaje, cuando se observen los primeros individuos de la plaga; volumen de aplicación 370-470 L de agua/ha.

*(7): Intervalo de seguridad: Días que deben transcurrir entre la última aplicación y la cosecha.

CULTIVO	ABAMECTINA LMR (MG/KG)	BIFENTRINA LMR (MG/KG)
Limonero Lima Mandarino Naranja Tangerino Toronjo	0.15 (UE)	0.05 (UE*)
Calabaza Calabacita Melón Pepino Sandía	0.01 (UE)	0.02 (UE)
Pepino	0.04 (UE)	0.01 (UE)
Jitomate Chile Papa Tomate de cáscara	0.09 (UE)	0.03 (UE)

*Unión Europea

MÉTODOS PARA PREPARAR Y APLICAR EL PRODUCTO.

Con el equipo de protección puesto, abra el envase, desenroscando la tapa hasta romper el sello de seguridad exterior y retírela totalmente, invierta la tapa y colóquela en la parte superior de la boca del envase, insertando la pestaña sobre el sello de seguridad interior, gire varias veces hasta romper este sello. Realice esta operación con mucho cuidado a fin de evitar salpicaduras y el contacto con la piel y ojos. Mida con una probeta de plástico, o con algún otro utensilio graduado específico para este uso, la cantidad de producto a utilizar. Haga una pre-mezcla con la cantidad de producto necesario, para lo cual llene con agua la mitad del tanque (tambo) o depósito de la aspersora, agregue la dosis recomendada del producto, agite perfectamente y adicione la cantidad de agua restante. Agite continuamente. Aplique la mezcla el mismo día en que la prepare.

CONTRAINDICACIONES

No se debe aplicar en horas de calor intenso ni cuando la velocidad del viento sea mayor de 15 km/hr.

FITOTOXICIDAD

BAVARON MAX no es fitotóxico en los cultivos y dosis aquí indicadas, si es aplicado de acuerdo con las recomendaciones de la etiqueta.

INCOMPATIBILIDAD

No mezclar con otros productos, aplíquese solo.

“MANEJO DE RESISTENCIA”:

“PARA PREVENIR EL DESARROLLO DE POBLACIONES RESISTENTES, SIEMPRE RESPETE LAS DOSIS Y LAS FRECUENCIAS DE APLICACIÓN; EVITE EL USO REPETIDO DE ESTE PRODUCTO, ALTERNÁNDOLO CON OTROS GRUPOS QUÍMICOS DE DIFERENTES MODOS DE ACCIÓN Y DIFERENTES MECANISMOS