



BILBAO®



NOCIVO SI SE INHALA

“ALTO LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”
“INSTRUCCIONES DE USO”
“SIEMPRE CALIBRE SU EQUIPO DE APLICACIÓN”

Oxyfluorfen

Herbicida / Concentrado Emulsionable

RSCO-HEDE-0243-X0268-009-24.20

GLO

COMPOSICIÓN PORCENTUAL

% EN PESO

INGREDIENTE ACTIVO:

Oxyfluorfen: 2-cloro- α,α,α -trifluoro-p-tolil 3-etoxi-4-nitrofenil éter

(Equivalente a 240 g. de i.a./L) a 20°C **24.2%**

INGREDIENTES INERTES:

Emulsificante, antioxidante y disolventes **75.80%**

TOTAL **100.0%**

INFORMACIÓN GENERAL:

BILBAO es un herbicida pre-emergente y post-emergente en aplicaciones dirigidas, que actúa de contacto. El control se puede observar entre los 2 a 7 días después de la aplicación. Herbicida con poder residual que es favorecido por las condiciones de alta humedad y sombreado.

CULTIVO	MALEZA	DOSIS L/Ha	OBSERVACIONES
Ajo (60)	Verdolaga (<i>Portulaca oleracea</i>) Correhuela (<i>Convolvulus arvensis</i>) Borrajá (<i>Sonchus oleraceus</i>) Zacate pinto (<i>Echinochloa crusgalli</i>)	0.5 - 0.75	Aplicación en control de malezas.
	Lechocilla (<i>Euphorbia heterophylla</i>)	1.0	
	Lechosa (<i>Euphorbia stictospora</i>)	0.75	
Cebolla (45)	Amargosa (<i>Parthenium hysterophorus</i>) Quelite o Bledo (<i>Amaranthus albus</i>) Gloria de la mañana (<i>Ipomoea sp.</i>)	1.0 - 2.0	Aplicación en control de malezas.
	Bledo común (<i>Amaranthus spinosum</i>) Verdolaga (<i>Portulaca oleracea</i>) Chicalote (<i>Argemone mexicana</i>)	0.3 - 0.55	
	Correhuela (<i>Convolvulus arvensis</i>) Borrajá (<i>Sonchus oleraceus</i>) Zacate pinto (<i>Echinochloa crus-galli</i>)	0.5 - 0.75	
	Lechocilla (<i>Euphorbia sp.</i>)	1.0	
	Lechosa (<i>Euphorbia stictospora</i>)	0.75	
	Quelite de perro (<i>Chenopodium murale</i>) Quelite o Bledo (<i>Amaranthus albus</i>) Quintonil (<i>Amaranthus hybridus</i>)	1.5 - 2.5	
Almendra Ciruelo (1)	Quelite o Bledo (<i>Amaranthus albus</i>)	2.0 - 4.0	Aplicación en control de malezas.
Durazno (1)	Zacate gramma (<i>Cynodon dactylon</i>) Quelite o Bledo (<i>Amaranthus albus</i>) Rosilla, aceitilla (<i>Bidens odorata</i>)	2.0 - 4.0	Aplicación en control de malezas.
	Epazote cimarrón (<i>Chenopodium graveolens</i>)	1.5 - 2.5	

CULTIVO	MALEZA	DOSIS L/Ha	OBSERVACIONES
Manzano (1)	Diente de león (<i>Taraxacum officinale</i>)	0.2 - 0.3	Aplicación en control de malezas.
	Cebadilla (<i>Bromas carinatus</i>)		
	Zacate pata de gallina (<i>Eleusine indica</i>)		
	Trébol amarillo de olor (<i>Melilotus indicus</i>)		
	Lentejilla (<i>Lepidium virginicum</i>)		
	Zacate pegaropa (<i>Setaria verticillata</i>)		
	Cilantro (<i>Descurainia pinnata</i>)		
Nogal (1)	Gusanillo (<i>Acalypha alopecuroides</i>)	0.2 - 0.3	Aplicación en control de malezas.
	Quelite o Bledo (<i>Amaranthus albus</i>)		
	Zacate liendrilla (<i>Leptochloa fascicularis</i>)		
	Zacate de agua (<i>Echinochloa colonum</i>)		
	Zacate pegaropa (<i>Setaria verticillata</i>)		
	Quelite (<i>Amaranthus palmeri</i>)		
	Amargosa (<i>Helianthus ciliaris</i>)		
Peral (1)	Verdolaga (<i>Portulaca oleracea</i>)	0.2 - 0.3	Aplicación en control de malezas.
	Borraja (<i>Sonchus asper</i>)		
	Campanilla (<i>Ipomoea purpurea</i>)		
	Quelite o Bledo (<i>Amaranthus albus</i>)		
	Diente de león (<i>Taraxacum officinale</i>)		
	Cebadilla (<i>Bromas carinatus</i>)		
	Zacate pata de gallina (<i>Eleusine indica</i>)		
Brocoli* Col Coliflor (35)	Trébol amarillo de olor (<i>Melilotus indicus</i>)	0.2 - 0.3	Aplicación en control de malezas.
	Lentejilla (<i>Lepidium virginicum</i>)		
	Zacate pegaropa (<i>Setaria verticillata</i>)		
	Cilantro (<i>Descurainia pinnata</i>)		
	Gusanillo (<i>Acalypha alopecuroides</i>)		
	Pasto moro (<i>Leptochloa filiformis</i>)		
	Rosilla, aceitilla (<i>Bidens odorata</i>)		
Cafeto (1)	Quelite (<i>Amaranthus hybridus</i>)	1.0 - 2.0	*Realizar una aplicación en pre-emergencia a la maleza, aplicar 2 días antes del trasplante del cultivo con suelo húmedo; volumen de aplicación 250-350 L de agua/ha.
	Zacate de agua (<i>Echinochloa colonum</i>)		
	Acahual (<i>Simsia amplexicaulis</i>)		
	Verdolaga (<i>Portulaca oleracea</i>)		
	Perita, perilla (<i>Lopezia racemosa</i>)		
	Quelite o Bledo (<i>Amaranthus albus</i>)		
	Alfilerillo (<i>Erodium cicutarium</i>)		
Lima Limónero Mandarino Naranja Toronjo (1)	Estrellita (<i>Galinsoga parviflora</i>)	0.5 - 0.75	Aplicación en control de malezas
	Pata de gallo (<i>Eleusine indica</i>)		
	Pegaropa (<i>Setaria viridis</i>)		
	Quelite o Bledo (<i>Amaranthus albus</i>)		
	Siempre viva (<i>Commelina erecta</i>)		
	Milo (<i>Digitaria horizontalis</i>)		
	Zacate amargoso (<i>Digitaria insularis</i>)		
Lima Limónero Mandarino Naranja Toronjo (1)	Zacate pinto (<i>Echinochloa colonum</i>)	0.25 - 0.30	Aplicación en control de malezas.
	Flor amarilla (<i>Melampodium divaricatus</i>)		
	Caminadora (<i>Rottboellia cochinchinensis</i>)		
	Escobilla (<i>Sida acuta</i>)		
	Camalote (<i>Urochloa mollis</i>)		
	Siempre viva (<i>Commelina erecta</i>)		
	Milo (<i>Digitaria horizontalis</i>)		

CULTIVO	MALEZA	DOSIS L/Ha	OBSERVACIONES
Plátano (1)	Quelite o Bledo (<i>Amaranthus albus</i>)	0.20 – 0.30	Aplicación en control de malezas.
	Rosa Trinidad (<i>Commelina serrulata</i>)		
	Zacate pinto (<i>Echinochloa colonum</i>)		
	Zacate pata de gallina (<i>Eleusine indica</i>)		
	Zacate plumilla (<i>Leptochloa filiformis</i>)		
	Quesillo (<i>Malva parviflora</i>)		
	Flor amarilla (<i>Melampodium divaricatus</i>)		
	Coyol (<i>Oxalis latifolia</i>)		
	Caminadora (<i>Rottboellia cochinchinensis</i>)		
Soya (60)	Escobilla (<i>Sida acuta</i>)		
	Quelite de perro (<i>Chenopodium murale</i>)	1.0 – 2.0	Aplicación en control de malezas.
	Quintonil (<i>Amaranthus hybridus</i>)	1.0 - 1.5	
Vid (21)	Quelite o Bledo (<i>Amaranthus albus</i>)	1.5 - 3.0	Aplicación en control de malezas.
	Verdolaga (<i>Portulaca oleracea</i>)		
	Zacate buffel (<i>Cenchrus ciliaris</i>)		
	Zacate Johnson (<i>Sorghum halepense</i>)		
	Bledo común (<i>Amaranthus spinosum</i>)		
	Quelite, bledo (<i>Amaranthus albus</i>)		
	Zacate liendrilla (<i>Leptochloa filiformis</i>)		
	Lechocilla (<i>Euphorbia sp.</i>)	1.0 - 2.0	

() INTERVALO DE SEGURIDAD: Días que deben transcurrir entre la última aplicación del producto y la cosecha.
PERÍODO DE REENTRADA A ÁREAS TRATADAS: Después de 24 horas de la aplicación del producto.

MÉTODO PARA PREPARAR Y APLICAR EL PRODUCTO: Lea cuidadosamente las instrucciones. Rompa la película plástica protectora del envase y la tapa, desenrosque la tapa, quite con cuidado el sello protector, evitando salpicaduras y contacto con la piel y los ojos, utilice siempre su equipo protector (mascarilla, gorra, camisa de manga larga, overol, pantalones largos, lentes de seguridad, calcetines, botas y guantes de neopreno).
 Mezcle la dosis de **BILBAO** en la cantidad necesaria de agua para cubrir la superficie que va a tratar. La cantidad de la mezcla variará de acuerdo con la altura de la maleza y la forma de aplicación.

PRE-EMERGENCIA: La aplicación se puede realizar en forma superficial al suelo después de la siembra, pero antes de la germinación. La superficie del suelo debe de estar húmedo (lluvia o riego) para que **BILBAO** actúe adecuadamente. Mezcle el producto con agua limpia y en cantidades suficientes para lograr un buen cubrimiento. Se aplican de 150 a 300 litros de agua / hectárea con los equipos convencionales de aspersión, usando una boquilla de abanico (Teejet 8002 o 8003).

POST-EMERGENCIA: El producto debe usarse solamente contra malezas que tengan de 3 a 4 cm de altura. El tratamiento deberá ser dirigido, por lo que no será selectivo. Se aplican de 200 a 400 litros de agua / hectárea usando boquillas de abanico (Teejet 8003 o 8004). En los casos donde se aplique **BILBAO** con otros herbicidas, su residualidad se podrá prolongar, (que normalmente es de 15 a 20 días) hasta 60 días o más, dependiendo de la maleza, condiciones locales y al herbicida usado junto con **BILBAO**.

CONTRAINDICACIONES: Por la actividad residual de **BILBAO** el suelo tratado debe ser incorporado a una superficie de 10 cm antes de sembrar o plantar cualquier cultivo de rotación. NO aplique el producto en el cultivo de la VID en temporada de temperaturas altas ni lluvias frecuentes.

INCOMPATIBILIDAD: No mezclar **BILBAO** con otros productos. Si se desea mezclar, la mezcla se realizará con productos registrados en los cultivos autorizados de tanque, sin embargo, si desea mezclar, las mezclas sólo deberán realizarse con otros productos agroquímicos registrados para los cultivos recomendados en esta etiqueta. Antes de mezclar **BILBAO** con otros productos, realice una prueba previa para comprobar la compatibilidad y la fitotoxicidad.

FITOTOXICIDAD: Se puede presentar ligeros daños fitotóxicos para los cultivos de Crucíferas en pre-transplante.

BILBAO no causa fitotoxicidad en los cultivos especificados en la etiqueta, si se siguen las instrucciones correctamente indicadas en la misma.

“MANEJO DE RESISTENCIA”: PARA PREVENIR EL DESARROLLO DE POBLACIONES RESISTENTES, SIEMPRE RESPETE LAS DOSIS Y LAS FRECUENCIAS DE APLICACIÓN; EVITE EL USO REPETIDO DE ESTE PRODUCTO, ALTERNÁNDOLO CON OTROS GRUPOS QUÍMICOS DE DIFERENTES MODOS DE ACCIÓN Y DIFERENTES MECANISMOS DE DESTOXIFICACIÓN Y MEDIANTE EL APOYO DE OTROS MÉTODOS DE CONTROL.

PRESENTACIONES: 950 ML.