

"USO AGRÍCOLA"

BIOFEED

Fertilizante Inorgánico foliar

RSCO-135/III/13

¿Qué es Biofeed?

Es un fertilizante foliar con alta concentración de fósforo y potasio: altamente asimilable que favorece la resistencia a enfermedades y al estrés por falta de agua. Biofeed® promueve la floración, evita abortos, activa los procesos energéticos vegetal es relacionados con la síntesis de ácidos nucleídos y azúcares mejorando el llenado de frutos y granos, la consistencia, el peso, los azúcares, el sabor, el aroma, el picor para el caso de chiles, aumenta la resistencia a golpes en empaque y transporte, favoreciendo una mayor vida de anaquel y como principal beneficio aumenta el rendimiento.



Composición Garantizada:

Fósforo	10%
Potasio	37%
Boro	0.600%
Cobre	0.050%
Hierro	0.050%
Zinc	0.070%
Oligosacarinas	1.00%
Manganeso	0.060%

Presentación:

1 L

Fichas técnicas

Línea Agrícola

"USO AGRÍCOLA"



Cultivos	Dosis (L/Ha)	Recomendaciones
Agave azul	3 a 5	Aplicar al follaje, iniciando el temporal, cada 15 días, por lo menos 2 aplicaciones, 3L en plantas hasta de 3 años de 4 L en plantas de 4 años o más.
Aguacate	4 a 6	Aplicar a partir de la floración hasta la cosecha cada 15 días.
Alfalfa, forrajes, pastos	2 a 4	15 días después de cada corte.
Algodón	2 a 4	Hacer la aplicación antes del papaloteo y después cada 15 días.
Brócoli, coliflor, col, lechuga, espinaca y zanahoria.	2 a 3	Aplicar a partir de los 21 días de trasplantado y durante todo el ciclo cada 15 días.
Caña de azúcar	3 a 4	Aplicar a los 45 días de brotado y cada 21 días.
Cebolla, ajo	2 a 3	A partir de los 21 días del trasplante, repitiendo cada 15 días.
Ciruelo, cafeto, durazno, nogal, mango, manzano, guayabo		Aplicar desde la prefloración y durante la cosecha.
Flores de corte	2 a 3	Aplicar desde el inicio del botoneo a intervalos de 15 días.
Fresa, frambuesa, zarzamora, arándano. vid	2 a 4	Hacer las aplicaciones desde la prefloración y durante la cosecha repitiendo cada 15 días.
Frijol, haba, soya, chícharo, cacahuete, garbanzo	2 a 3	A los 35 días de emergida y cada 15 días.
Maíz, sorgo, trigo, cebada, avena	3 a 4	Hacer la aplicación en floración y llenado de grano.
Papa	2 a 3	Aplicar a los 35 días de brotada y cada 15 días.
Piña	3 a 6	Hacer la aplicación cuando se presente la caída de los pétalos, a intervalos de 15 días.
Platano y papaya	3 a 5	Aplicar un mes antes de floración hasta el llenado de fruto cada 15 días.
Jitomate, chile, melón, sandía, calabaza, pepino, espárrago	2 a 4	Aplicar en prefloración y durante la cosecha, cada 15 días

Beneficios y Ventajas:

- Mejora el llenado de los frutos y granos.
- Da resistencia a las enfermedades y al estrés por falta de agua. Promueve la floración.
- Mejora el llenado de frutos y granos.
- Aumenta el rendimiento de la planta.
- Mejora el sabor, el aroma de los frutos y el picor en caso de chiles.
- Aumenta la resistencia a golpes en empaque y transporte.
- Le da al fruto mayor vida en anaquel.

Nota: Consultar al Ingeniero Agrónomo que le asista técnicamente su cultivo, para estimar las dosis del producto para cada uno de sus cultivos de interés.

GARANTÍA

Debido a que sale del alcance de BIOCHEM SYSTEMS, S.A. DE C.V. la empresa no se hace responsable por el mal uso del producto si se mezcla con productos incompatibles, ni por los daños que puedan causarse en caso de no cumplir con las recomendaciones señaladas en la etiqueta del producto.

LEA CUIDADOSAMENTE LAS INSTRUCCIONES. Las contraindicaciones e incompatibilidad se encuentran descritos en la etiqueta del producto.

EN CASO DE INTOXICACIÓN LLEVE AL PACIENTE CON EL MÉDICO Y MUESTRELE LA ETIQUETA DEL PRODUCTO