



BioHammer M

LÍQUIDO SOLUBLE


¿POR QUÉ UTILIZAR BIOHAMMER M?

BioHammer M es un producto de origen biológico-botánico recomendado para el control de gusano cogollero (*Spodoptera frugiperda*) y gusano de la mazorca (*Heliothis zea*), entre otros; contiene microorganismos que producen toxinas como los hongos entopatógenos, que inician su ciclo patogénico con la adhesión de la espora en la cutícula del insecto, ingresan en el hemocele, se nutren de él y provocan la muerte.

BioHammer M contiene microorganismos entomopatógenos como la bacteria *Bacillus thuringiensis* que genera simultáneamente cristales y esporas con efecto tóxico al ser ingeridos por los insectos. Así también el hongo *Beauveria bassiana*, que penetra en los insectos, degradando el tejido mediante la acción enzimática (proteasas, aminopeptidasas, lipasas y quitinasas), generando una septicemia en el insecto y provocando la muerte por una combinación de efectos que comprenden el daño físico de tejidos, toxicosis, deshidratación de las células por pérdida de fluido y consumo de nutrientes.

BENEFICIOS

- Actúa como preventivo por su acción repelente.
- Coloniza y parasita rápidamente los insectos.
- Presenta diferentes modos de acción con alta efectividad.
- Excelente cobertura que favorece su efectividad.
- No daña a los insectos benéficos.
- Amplia gama de control de insectos en diferentes etapas del cultivo.



más Resultados
al **menor** costo



agribest.com.mx





BioHammer M

COMPOSICIÓN PORCENTUAL

%(P/V)

Beauveria bassiana (1x10 ⁷ UFC/mL)	30.00%
Bacillus thuringiensis (1x10 ⁷ UFC/mL)	10.00%
Diluyentes	60.00%
Total	100.00%

CARACTERÍSTICAS FÍSICOQUÍMICAS:

Densidad (g/mL): 0.95 + 0.1 ; pH: 4.5 + 1.0

INSTRUCCIONES DE USO:

PLAGA	CULTIVO	DOSIS	FRECUENCIA DE APLICACIÓN
Gusano cogollero (Spodoptera frugiperda)	Maíz	1.0 - 2.0 L / ha	2 aplicaciones con intervalo de 7 días entre la primera y la segunda aplicación.
Gusano falso medidor (Trichoplusia ni)	Tomate verde, Tomate rojo, Papa, Chile, Pimiento morrón, Pepino, Melón, Calabaza, Calabacita, Sandía, Chayote, Col de Bruselas, Lechuga, Espinaca, Acelga, Apio.	1.0 - 2.0 L / ha	2 aplicaciones con intervalo de 9 días entre la primera y la segunda aplicación.
Gusano soldado (Spodoptera exigua)	Tomate verde, Tomate rojo, Papa, Chile, Pimiento morrón, Pepino, Melón, Calabaza, Calabacita, Sandía, Chayote, Col de Bruselas, Lechuga, Espinaca, Acelga, Apio.	1.0 - 2.0 L / ha	2 aplicaciones con intervalo de 7 días entre la primera y la segunda aplicación.

Gusano de fruto (<i>Heliothis zea</i>)	Zarzamora, Arándano, Grosella, Frambuesa, Fresa, Tomate verde, Tomate rojo, Papa, Chile, Pimiento morrón, Pepino, Melón, Calabaza, Calabacita, Sandía, Chayote, Col de bruselas.	1.0 - 2.0 L / ha	2 a 3 aplicaciones con intervalo de 7 días entre la primera y la segunda aplicación y 14 días entre la segunda y tercera.
Gallina ciega (<i>Phyllophaga spp.</i>)	Maíz	1.0 - 1.5 L / ha	2 aplicaciones con intervalo de 7 días entre la primera y la segunda aplicación.
Palomilla dorso de diamante (<i>Plutella xylostella</i>)	Coliflor, brócoli, col, col repollo.	1.0 L / ha 1.5 - 2.0 L / ha	1 aplicación como preventivo. 2 a 3 aplicaciones con intervalo de 7 días entre la primera y la segunda aplicación y 14 días entre la segunda y tercera.

MÉTODO PARA PREPARAR Y USAR EL PRODUCTO



Antes de abrir el envase,
agite perfectamente
BioHammer M y
abra con cuidado el envase,



Mida la cantidad indicada y viértala
en un recipiente conteniendo
los litros de agua limpia necesarios.

Mézclese de manera correcta y aplique inmediatamente.

MÉTODO PARA APLICAR EL PRODUCTO

- Aplicación foliar.
- Aplicar con mochila manual o motorizada, con boquilla de cono hueco con bajo volumen de descarga.
- Se recomienda en la aplicación asperjar hasta punto de goteo en el haz y envés de la hoja.
- Se sugiere aplicación por la mañana o por la tarde, los días nublados favorecen la efectividad.
- Dos horas posteriores a su aplicación en condiciones controladas o protegidas como invernaderos se sugiere evitar ventilación.
- Puede agregar coadyuvantes a base de sales potásicas o jabones agrícolas para reforzar la adherencia y residualidad del producto.

INCOMPATIBILIDAD

BioHammer M es compatible con la mayoría de los agroquímicos. Sin embargo, se sugiere hacer pruebas antes de realizar mezclas.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE



Almacene el producto en lugares frescos y cubiertos.



No se deje al alcance de los niños ni se ponga en contacto con animales o alimentos.



Dispóngase de los envases vacíos conforme al reglamento de la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, en materia de residuos peligrosos.

TOXICIDAD

BioHammer M no es fitotóxico a las concentraciones, etapas y formas de aplicación recomendadas en la etiqueta. Categoría toxicológica: 5. Verde.