



BioKontrol Fol

LÍQUIDO SOLUBLE

¿POR QUÉ UTILIZAR BIOKONTROL FOL?


BioKontrol Fol es un biofungicida orgánico e inductor de resistencia sistémica de las plantas, único en su tipo.

Está formulado a partir de la bacteria *Bacillus subtilis* antagonista y productora de antibióticos absorbidos por las hojas de las plantas, induce la resistencia sistémica creando una película protectora en la superficie de la parte aérea de las plantas contra una amplia gama de enfermedades fúngicas. Evita la adherencia del patógeno y limita la germinación de esporas interrumpiendo el crecimiento del mismo.

BioKontrol Fol presenta potente efecto de inhibición del crecimiento de hifas y/o micelios debido a la secreción de enzimas digestoras que destruyen los hongos y alimentándose de estos, posee la capacidad de absorción y neutralización de microorganismos puesto que la bacteria *Bacillus subtilis* genera la síntesis de metabolitos peptídicos de efecto antibiótico.

BENEFICIOS

- Acción inductora de resistencia activa a enfermedades foliares.
- Amplio rango de control de hongos y bacterias fitopatógenas.
- Fijación biológica del nitrógeno.
- Posee una amplia gama de vías de combate contra enfermedades foliares.
- Genera resistencia sistemática en el cultivo.



más Resultados
al **menor** costo



agribest.com.mx





Biokontrol Fol

COMPOSICIÓN PORCENTUAL

%(P/V)

Bacillus subtilis
(1×10^6 UFC/mL)

70.00 %

Diluyentes

30.00 %

Total

100.00 %

CARACTERÍSTICAS FÍSICOQUÍMICAS:

Densidad (g/mL): 0.99 + 0.1 ; pH: 5.0 + 1.0

INSTRUCCIONES DE USO:

PLAGA	CULTIVO	DOSIS	FRECUENCIA DE APLICACIÓN
Mildiu (Pseudoperonospora cubensis)	Pepino, Melón, Calabaza.	1.0 L / 200 L de agua	1 aplicación como preventivo.
		1.0 - 1.5 L / 200 L de agua	2 aplicaciones con intervalo de 7 días entre la primera y la segunda aplicación.
Alternaria (Alternaria Solani)	Charolas o almácigo. Tomate rojo, Tomate de cáscara, Pimiento morrón, Pepino, Calabaza, Melón, Sandía, Papaya, Chicharo.	1.0 L / 200 L de agua	1 aplicación como preventivo después de la siembra.
		1.0 - 1.5 L / 200 L de agua	2 a 3 aplicaciones con intervalo de 7 días entre la primera y la segunda aplicación y 14 días entre la segunda y tercera.
Botritis (Botrytis Cinerea)	Tomate rojo, Tomate de cáscara, Pepino, Calabaza, Melón, Sandía, Papaya, Chicharo, Fresa. Orquídeas.	1.0 L / 200 L de agua	1 aplicación como preventivo.
		1.5 - 2.0 L / 200 L de agua	2 aplicaciones con intervalo de 9 días entre la primera y la segunda aplicación.
Roya del café (Hemileia vastatrix)	Café	1.0 L / 200 L de agua	1 aplicación como preventivo.
		1.5 - 2.0 L / 200 L de agua	2 a 3 aplicaciones con intervalo de 7 días entre la primera y la segunda aplicación y 18 días entre la segunda y tercera.

Mancha de hierro (Cercospora coffeicola)	Café	1.0 L / 200 L de agua	1 aplicación como preventivo.
		1.5 - 2.0 L / 200 L de agua	2 aplicaciones con intervalo de 7 días entre la primera y la segunda aplicación.
Cenicilla (Oidium neolycopersicum)	Pepino, Melón, Calabaza, Chile, Tomate verde, Papa, Pimiento morrón, Papaya, Chicharo.	1.0 L / 200 L de agua	1 aplicación como preventivo.
		1.5 - 2.0 L / 200 L de agua	2 aplicaciones con intervalo de 7 días entre la primera y la segunda aplicación.
Antracnosis (Colletotrichum spp.)	Lechuga, Limón	1.0 L / 200 L de agua	1 aplicación como preventivo.
		1.5 - 2.0 L / 200 L de agua	2 aplicaciones con intervalo de 8 días entre la primera y la segunda aplicación.
Peronospora (Peronospora sparsa)	Zarzamora	1.0 L / 200 L de agua	1 aplicación como preventivo.
		1.5 - 2.5 L / 200 L de agua	2 aplicaciones con intervalo de 7 días entre la primera y la segunda aplicación.

MÉTODO PARA PREPARAR Y USAR EL PRODUCTO

- Antes de abrir el envase, agite perfectamente BioKontrol Fol y abra con cuidado el envase.
- Mida la cantidad indicada y viértala en un recipiente conteniendo los litros de agua limpia necesarios.
- Mézclese de manera correcta y aplique inmediatamente.


MÉTODO PARA APLICAR EL PRODUCTO

- Aplicación foliar.
- Aplicar con mochila manual o motorizada, con boquilla de cono hueco con bajo volumen de descarga.
- Se recomienda en la aplicación asperjar hasta punto de goteo en el haz y envés de la hoja.
- Se sugiere aplicación por la mañana o por la tarde, los días nublados favorecen la efectividad.
- Dos horas posteriores a su aplicación en condiciones controladas o protegidas como invernaderos se sugiere evitar ventilación.
- Puede agregar coadyuvantes a base de sales potásicas o jabones agrícolas para reforzar la adherencia y residualidad del producto.

INCOMPATIBILIDAD

BioKontrol Fol no es compatible con fungicidas o bactericidas, ni productos a base de azufre y cobre. Sin embargo, se sugiere hacer pruebas antes de realizar la mezcla final.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE



Almacene el producto en lugares frescos y cubiertos.



No se deje al alcance de los niños ni se ponga en contacto con animales o alimentos.



Dispóngase de los envases vacíos conforme al reglamento de la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, en materia de residuos peligrosos.

TOXICIDAD

BioKontrol Fol no es fitotóxico a las concentraciones, etapas y formas de aplicación recomendadas en la etiqueta.

Categoría toxicológica: 5. Verde. Puede ser nocivo en caso de ingestión. Puede ser nocivo por el contacto con la piel. Puede ser nocivo si se inhala.

En caso de ingestión provoque el vómito y consulte a su médico.

