



500

BRIDON®

Estreptomicina+oxitetraciclina+cobre
Bactericida+fungicida agrícola / polvo humectable
RSC0-ME2C-1306-302-002-081

COMPOSICIÓN PORCENTUAL

% EN PESO

INGREDIENTE ACTIVO:

Estreptomicina: Sulfato de estreptomicina, con un contenido de estreptomicina no menor del 80%
(Equivalente a 17.6 g de i.a./kg.). **2.205%**

Oxitetraciclina: Clorhidrato de oxitetraciclina, con un contenido de oxitetraciclina no menor del 75%
(Equivalente a 1.75 g de i.a./kg.). **0.189%**

Cobre: Sulfato tribásico de cobre, con un contenido de cobre no menor del 54%
(Equivalente a 424 g de i.a./kg.). **78.489%**

INGREDIENTES INERTES:
Diluyentes y Humectantes. **19.117%**

TOTAL: **100.0%**



NOCIVO EN CASO DE INGESTIÓN

“ALTO LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”

“INSTRUCCIONES DE USO”

“SIEMPRE CALIBRE SU EQUIPO DE APLICACIÓN”

BRIDON 500 es una mezcla de dos antibióticos (estreptomicina, oxitetraciclina) más sulfato tribásico de cobre, con propiedades sistémicas y de contacto, formulado como polvo humectable para la prevención y control de la enfermedad bacteriana conocida como Tizón de fuego.

CULTIVO

ENFERMEDADES

DOSIS

PERAL
(30)

TIZON DE FUEGO / *Erwinia amylovora*

600 g/100 L de agua.

() Días entre la última aplicación y la cosecha.

Tiempo de reentrada a los lugares tratados: en cuanto seque el rocío de la aplicación.

MÉTODO DE PREPARACIÓN Y APLICACIÓN DEL PRODUCTO

En una cubeta con agua mezcle la cantidad necesaria de **BRIDON 500** para la aplicación y agite hasta obtener una lechada uniforme. Sin dejar de agitar, agregue lentamente esta suspensión al tanque de aplicación o tambo de 200 L que contenga agua hasta la mitad de su capacidad. Agregue la cantidad faltante de agua y mantenga la agitación hasta obtener una mezcla uniforme y sin grumos. En cada ocasión que cargue la aspersora deberá agitar la mezcla del tambo. **BRIDON 500** puede ser aplicado con cualquier equipo aspersor siempre y cuando facilite la cobertura uniforme de las superficies tratadas.

CONTRAINDICACIONES

BRIDON 500 contiene antibióticos no estériles, por lo que deberá evitar su uso en medicina veterinaria, humana o cualquier otro uso diferente al agrícola.

FITOTOXICIDAD

BRIDON 500 no es fitotóxico al cultivo indicado en la dosis recomendada. Sin embargo, deberá aplicarse respetando las indicaciones de uso recomendadas en la etiqueta.

INCOMPATIBILIDAD

BRIDON 500 no debe ser mezclado con productos de fuerte reacción alcalina como caldo bordelés. La mezcla con otros productos deberá hacerse con aquellos que se encuentren registrados y autorizados en los cultivos aquí recomendados.

MANEJO DE RESISTENCIA

“PARA PREVENIR EL DESARROLLO DE POBLACIONES RESISTENTES, SIEMPRE RESPETE LAS DOSIS Y LAS FRECUENCIAS DE APLICACIÓN; EVITE EL USO REPETIDO DE ESTE PRODUCTO, ALTERNÁNDOLO CON OTROS GRUPOS QUÍMICOS DE DIFERENTES MODOS DE ACCIÓN Y DIFERENTES MECANISMOS DE DESTOXIFICACIÓN Y MEDIANTE EL APOYO DE OTROS MÉTODOS DE CONTROL”.