“ALTO, LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”

“PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO”
Durante el manejo de este producto siempre utilice equipo de protección personal adecuado: overol o camisa de manga larga y pantalón largo (de algodón), guantes de nitrilo, mascarilla, lentes de seguridad y botas de caucho.

“PRECAUCIONES DURANTE EL MANEJO DEL PRODUCTO”
“NO COMA, BEBA O FUME CUANDO ESTE UTILIZANDO ESTE PRODUCTO”, “NO SE TRANSPORTE NI ALMACENE JUNTO A PRODUCTOS ALIMENTICIOS, ROPA O FORRAJES”, “MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS, MUJERES EMBARAZADAS, EN LACTANCIA Y ANIMALES DOMÉSTICOS”, “LÁVESE LAS MANOS DESPUÉS DE UTILIZAR EL PRODUCTO Y ANTES DE CONSUMIR ALIMENTOS”, “NO ALMACENE EN CASAS HABITACIÓN”, “NO USE EL PRODUCTO SIN EL EQUIPO DE PROTECCIÓN ADECUADO”, “LOS MENORES DE 18 AÑOS NO DEBEN MANEJAR ESTE PRODUCTO”, “AL FINAL DE LA JORNADA DE TRABAJO BAÑESE Y PÓNGASE ROPA LIMPIA”, “NO SE INGIERA, INHALE Y EVÍTESE EL CONTACTO CON LOS OJOS Y PIEL”, “NO MEZCLE O PREPARE EL PRODUCTO CON LAS MANOS, USE GUANTES, USE UN TROZO DE MADERA U OTRO MATERIAL APROPIADO”, “NO DESTAPE LA BOQUILLA CON LA BOCA”.

“EN CASO DE INTOXICACIÓN, LLEVE AL PACIENTE CON EL MÉDICO Y MUÉSTRELE ESTA ETIQUETA”.

PRIMEROS AUXILIOS
En caso de contacto con la piel o ropa: Quite la ropa contaminada y lave la piel con abundante agua corriente y jabón.
En caso de contacto con los ojos: Mantenga los párpados bien abiertos y lávelos con agua limpia durante 15 minutos.
En caso de Ingestión: Enjuague la boca con agua limpia y consiga ayuda médica inmediatamente. Si la persona vomita, asegúrese de que las vías respiratorias estén libres de obstrucción. Succione cualquier secreción oral o nasal.
En caso de inhalación: Retire a la persona del lugar contaminado. Asegúrese que respire sin dificultad. Si no puede respirar acuéstelo de lado, retire secreciones y objetos que obstruyan el paso del aire y dé respiración de boca a boca con un trapo de por medio.

RECOMENDACIONES AL MÉDICO
Grupo Químico: Ariloxifenoxipropionato
Antídoto: No existe antídoto específico.
Tratamiento: Proporcionar tratamiento sintomático y aplicar terapias de apoyo.
Signos y síntomas de Intoxicación: Puede causar irritación en los ojos, nariz, garganta y piel. Su ingestión puede causar gastroenteritis, náusea, vómito y diarrea.

“MEDIDAS PARA PROTECCIÓN AL AMBIENTE”
“DURANTE EL MANEJO DEL PRODUCTO, EVITE LA CONTAMINACIÓN DE SUELOS, RÍOS, LAGUNAS, ARROYOS, PRESAS, CANALES O DEPÓSITOS DE AGUA, NO LAVANDO O VERTIENDO EN ELLOS RESIDUOS DE PLAGUICIDAS O ENVASES VACÍOS”. “MANEJE EL ENVASE VACÍO Y LOS RESIDUOS DEL PRODUCTO CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA LEY GENERAL PARA LA PREVENCIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS, SU REGLAMENTO O AL PLAN DE MANEJO DE ENVASES VACÍOS DE PLAGUICIDAS, REGISTRADO ANTE LA SEMARNAT”. “EL USO INADECUADO DE ESTE PRODUCTO PUEDE CONTAMINAR EL AGUA SUBTERRÁNEA. EVITE MANEJARLO CERCA DE POZOS DE AGUA Y NO LO APLIQUE EN DONDE EL NIVEL DE LOS MANTOS ACUÍFEROS SEA POCO PROFUNDO (75 CM DE PROFUNDIDAD) Y LOS SUELOS SEAN MUY PERMEABLES (ARENOSOS)”. “EN CASO DE DERRAMES, SE DEBERÁ USAR EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL Y RECUPERAR EL PRODUCTO DERRAMADO CON ALGÚN MATERIAL ABSORBENTE (POR EJEMPLO: TIERRA O ARCILLA), COLECTAR LOS DESECHOS EN UN RECIPIENTE HERMÉTICO Y LLEVARLO AL CENTRO DE ACOPIO DE RESIDUOS PELIGROSOS AUTORIZADO MÁS CERCANO”. “REALICE EL TRIPLE LAVADO DEL ENVASE VACÍO Y VIERTA EL AGUA DE ENJUAGUE EN EL DEPOSITO O CONTENEDOR DONDE PREPARE LA MEZCLA PARA APLICACIÓN”.
“ESTE PRODUCTO ES **ALTAMENTE** TOXICO PARA ANIMALES (PECES, INVERTEBRADOS ACUÁTICOS) Y PLANTAS ACUÁTICAS (ALGAS Y PLANTAS VASCULARES)”.

GARANTIA
SHARDA DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V., garantiza que el contenido del envase se encuentra conforme a la composición porcentual de esta etiqueta. Como el almacenamiento, uso, manejo, dosificación y aplicación del producto están fuera de nuestro control SHARDA DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V., el fabricante o vendedor no se hacen responsables de los resultados, daños especiales o indirectos que con este producto se pudieran obtener, ni se otra otorga garantía expresa o implícita.

“USO AGRÍCOLA”

Sharda México

Elegant

QUIZALOFOP 10.5 EC

HERBICIDA / CONCENTRADO EMULSIONABLE

COMPOSICIÓN PORCENTUAL

INGREDIENTE ACTIVO	% EN PESO
Quizalofop-p-etil: Etil (R)-2-[4-(6-cloroquinoxalin-2-iloxi)fenoxi]propionato (Equivalente a 100 g de i.a. /L a 20ºC)	10.50 %

INGREDIENTES INERTES
Emulsificantes, solventes..... 89.50 %

No. DE REGISTRO: RSCO-HEDE-0262-X0115-009-10.50

CONTENIDO NETO: 1L

Nocivo en caso de ingestión

Número de lote:

Fecha de caducidad: 2 años a partir de su elaboración.

TITULAR DEL REGISTRO, IMPORTADOR Y DISTRIBUIDOR
SHARDA DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.
Aguascalientes No. 115
Col. Roma Sur
CP 06760, Ciudad de México.
Tel.: 5366 5800 Fax: 5366 58 00

Sharda México

“HECHO EN INDIA”
“ENVASADO EN MÉXICO”

“ÚSESE EXCLUSIVAMENTE EN LOS CULTIVOS Y ENFERMEDADES AQUI RECOMENDADOS”
“INSTRUCCIONES DE USO”
“SIEMPRE CALIBRE SU EQUIPO DE APLICACIÓN”

ELEGANT es un herbicida sistémico post-emergente, formulado como concentrado emulsionable que afecta principalmente los meristemos y tejidos jóvenes de la maleza. Se recomienda su uso en el cultivo para el control de las malezas que a continuación se mencionan.

CULTIVO	MALEZAS	DOSIS (mL/ha)	OBSERVACIONES
Papa (SL)	**Horquetilla** *(Paspalum conjugatum)* **Zacate pata de ganso** *(Eleusine multiflora)*	**400 - 500**	Realizar aplicación total en post-emergencia a la maleza y al cultivo, cuando la maleza tenga de 15 a 20 cm de altura.

( ) INTERVALO DE SEGURIDAD: Días que deben transcurrir entre la última aplicación y la cosecha.
Tiempo de reentrada a las zonas tratadas: 12 horas

MÉTODOS PARA PREPARAR Y APLICAR EL PRODUCTO
Con el equipo de protección puesto, agite el producto y abra cuidadosamente el envase embonando la parte superior de la tapa con la abertura del mismo. Gire presionando ligeramente hasta que el sello se rompa por completo al nivel del contorno de la boca del envase.
Llene los recipientes de los equipos de aplicación siempre a favor del viento, evitando derrames.
Coloque agua hasta la mitad de la capacidad del tanque de aspersión e iniciar la agitación, vierta la cantidad recomendad de **ELEGANT** y complete la capacidad del tanque con el agua necesaria.
Mantener la agitación durante la mezcla y aplicación del producto al cultivo.
El volumen e agua utilizado es de 300 mL/ha.

CONTRAINDICACIONES
Se recomienda hacer las aplicaciones en las primeras horas de la mañana. No se aplique en horas de calor intenso, cuando el viento sea fuerte (mayor a 15 km/hora) o cuando exista una alta probabilidad de lluvia próxima que pueda provocar el lavado del producto.

FITOTOXICIDAD
ELEGANT no es fitotóxico al cultivo aquí indicado si es aplicado de acuerdo a las recomendaciones de esta etiqueta.

INCOMPATIBILIDAD
NO mezclar **ELEGANT** con otros productos. Sin embargo, si se desea mezclar, se recomienda que la mezcla se realice con productos registrados ante la Autoridad competente para el cultivo recomendado en la etiqueta, haciendo pruebas preliminares de compatibilidad física y fitotoxicidad, previas a la aplicación.

MANEJO DE RESISTENCIA
“PARA PREVENIR EL DESARROLLO DE POBLACIONES RESISTENTES, SIEMPRE RESPETE LAS DOSIS Y LAS FRECUENCIAS DE APLICACIÓN; EVITE EL USO REPETIDO DE ESTE PRODUCTO, ALTERNÁNDOLO CON OTROS GRUPOS QUÍMICOS DE DIFERENTES MODOS DE ACCIÓN Y DIFERENTES MECANISMOS DE DESTOXIFICACIÓN Y MEDIANTE EL APOYO DE OTROS MÉTODOS DE CONTROL”.

PRECAUCIÓN