



Registro: RSCO-ATRA-0910H-X0003-446-89.07

Documento exclusivamente informativo sin valor legal. El único documento que avala el uso autorizado de un plaguicida es el Registro Sanitario Coordinado (RSCO) expedido por la COFEPRIS.

1. GENERALIDADES:

PROVIVI FAW es un plaguicida bioquímico a base de Acetato de 9-tetradecenilo y Acetato de (Z)-hexadec-11-enilo para uso agrícola, que consiste en un dispensador de descarga controlada de feromona de confusión sexual para formar una nube invisible en el cultivo de maíz, que confunde al macho de gusano cogollero (*Spodoptera frugiperda*) y evita que encuentre a la hembra para aparearse. De esta manera se disminuye la aparición de nuevas generaciones de cogollero.

2. COMPOSICIÓN PORCENTUAL DE INGREDIENTES ACTIVOS (% en peso):

Acetato de 9-tetradecenilo

Acetato de (Z) -9-tetradecen-1-ilo 77.49
(Equivalente a 679.59 g/L a 20°C)

Acetato de (Z) -hexadec-11-enilo

Acetato de (Z) -11-hexadecen-1-ol 11.58
(Equivalente a 101.56 g/L a 20°C)

INGREDIENTES INERTES

Antioxidantes, impurezas..... 10.93

TOTAL 100.00 %

PUEDE SER NOCIVO EN CASO DE INGESTIÓN
PUEDE SER NOCIVO POR EL CONTACTO CON LA PIEL
PUEDE SER NOCIVO SI SE INHALA

GARANTÍA: Se garantiza el contenido neto y la concentración expresada en la etiqueta, el fabricante y el distribuidor no se hacen responsables de los daños causados por manejo inadecuado o como resultado de condiciones climáticas adversas.

**3. CARACTERÍSTICAS DEL DISPENSADOR:**

Presentación	Dispensador de descarga controlada
Categoría toxicológica	Cinco (5)
Fitotoxicidad	No existe fitotoxicidad

4. MÉTODO PARA PREPARAR Y APLICAR EL PRODUCTO:

Antes de manipular y utilizar este producto, utilice el siguiente equipo de protección: *guantes de nitrilo, cubrebocas, camisa manga larga y pantalón de algodón u overol de algodón* que permita la transpiración. Durante el manejo del producto evite el contacto directo del contenido del dispensador con la piel o mucosas, y prendas de vestir. No inhale o ingiera el contenido del dispensador.

El equipo de protección personal deberá almacenarse en el lugar de trabajo y utilizarse para este único fin. Almacene PROVIVI FAW en un área fresca, seca y ventilada. No exponga este producto a luz solar directa durante el almacenamiento y manténgalo en un ambiente fresco, seco y ventilado a temperatura ambiente.

Abra cuidadosamente la bolsa que protege los dispensadores usando tijeras para cortar la esquina superior del empaque. Distribuya 30 dispensadores por hectárea, en una cuadrícula de manera uniforme por todo el campo, colocando sobre una estaca cada dispensador a una altura de 45 cm de la superficie del suelo. Realice la instalación de los dispensadores desde el estado de desarrollo vegetativo inicial (V1-V2), correspondiente a plantas de una a dos hojas verdaderas.

PROVIVI FAW actúa hasta 90 días después de la aplicación, por lo que es importante detectar oportunamente nuevas infestaciones de la plaga a través del uso de trampas con feromona o de inspecciones visuales en las plantas. En caso de ser necesario instale nuevamente PROVIVI FAW a los 90 días.

Las trampas para detección de gusano cogollero del maíz se deben colocar antes de manipular PROVIVI FAW. Al terminar de manipular las trampas para detección es necesario lavarse correctamente las manos para evitar contaminaciones.

FICHA TÉCNICA (3/4)

Durante el tratamiento con PROVIVI FAW se recomienda vigilar constantemente la aparición de plagas secundarias en el cultivo (tales como aves y roedores) para evitar que los dispensadores sean afectados.

5. RECOMENDACIONES TÉCNICAS DE USO:

Cultivo	Plaga	Dosis	Observaciones
Maíz (0)	Gusano cogollero (<i>Spodoptera frugiperda</i>)	30 Dispensadores /ha ¹	Colocar desde el estado de desarrollo vegetativo inicial (V1-V2) ² .

() Intervalo de seguridad: días que deben transcurrir entre la aplicación y la cosecha.

¹El rango de dosis aprobado en el registro es de 30 a 100 dispensadores / ha

²El estado vegetativo aprobado en el registro es desde V1 hasta V5

Tiempo de reentrada: 0 horas.

Almacene PROVIVI FAW en un área fresca, seca y ventilada

No exponga este producto a luz solar directa durante el almacenamiento y manténgalo en un ambiente fresco, seco y ventilado a temperatura ambiente.

Asegúrese de abrir el empaque de dispensadores sólo unas horas antes de su uso, esto con el fin de evitar que el contenido comience a evaporarse antes de tiempo.

No mezclar PROVIVI FAW con otros productos.

No instalar los dispensadores cuando exista riesgo de daño físico (lluvias intensas, granizo o vientos de alta velocidad).

Usar el producto según las recomendaciones señaladas en la etiqueta.

Provivi® no se hace responsable de los daños o pérdidas que resulten del uso de este producto de una manera no recomendada específicamente en la etiqueta / instrucciones. El usuario asume todos los riesgos asociados a un uso no recomendado.

FICHA TÉCNICA (4/4)**6. INFORMACIÓN ADICIONAL:**

En caso de contacto directo del contenido del dispensador con los ojos, piel o mucosas, lávese inmediatamente con abundante agua y retire la ropa contaminada. Si la irritación persiste, acuda al médico.

*Para más información comuníquese con
Provivi Pheromones de México, S.A. de C.V.
al teléfono: 55 3682 3682 o consulte nuestra
página web: www.provivi.com*

