

Galant™ Ultra

HERBICIDA

FICHA TÉCNICA

Galant™ Ultra es un herbicida para gramíneas de acción sistémica, selectivo a los cultivos de hoja ancha para uso postemergente en el cultivo y para el control de malezas.



HERBICIDA

Marca su territorio.

IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO

Ingrediente Activo: Haloxyfop-R-metil éster
Familia Química: Ariloxifenoxi
Presentaciones: 10L y 1L
Banda Toxicológica: 5 (Banda Verde).
Registro: RSCO-HEDE-0201Q-0301-009-010.51

COMPOSICIÓN DEL PRODUCTO

Ingrediente Activo: Haloxyfop-R-metil éster: Equivalente a 108 g i.a./L
Ingredientes Inertes: Surfactante, adyuvante, corrector de pH, co-solvente y solvente.

RECOMENDACIONES DE USO

MODO DE ACCIÓN:

Galant™ Ultra se absorbe principalmente por las hojas, para luego ser translocado a los tejidos meristemáticos de la maleza, inhibiendo su crecimiento y controlando su desarrollo.

Tiene como ingrediente activo al **Haloxyfop-R-Metil Éster** y actúa como un potente inhibidor enzimático de la *Acetil Coenzima A Carboxilasa (ACCase)*.

CULTIVO	MALEZAS	DOSIS (L/ha)	OBSERVACIONES	LMR (ppm)* Haloxyfop-R-me- til éster
Calabaza, Calabacita, Pepino, Sandía, Melón (40)	Pajarera (<i>Echinochloa gracilis</i>) Bromo de California y/o Masiyague (<i>Bromus carinatus</i>) Zacate gramma (<i>Cynodon dactylon</i>)	1.0 - 1.5	Se debe realizar una aplicación sobre la maleza en estado vegetativo hasta antes de la floración de ésta.	0.01
Chile, Pimiento, Jitomate, Berenjena, Tomate de cáscara, Papa (60)	Zacate gramma (<i>Cynodon dactylon</i>) Zacate de agua (<i>Eragrostis mexicana</i>) Zacate azul (<i>Sporobolus indicus</i>) Bromo de California y/o Masiyague (<i>Bromus carinatus</i>)			
Frijol, Garbanzo, Chicharo, Lenteja, Haba (60)	Bromo de California y/o Masiyague (<i>Bromus carinatus</i>) Zacate azul (<i>Sporobolus indicus</i>) Zacate gramma (<i>Cynodon dactylon</i>)			Frijol, Garbanzo, Chicharo, Haba: 0.15 Lenteja: 0.01
Cebolla, Ajo (30) Cebollín (60)	Zacate bromo (<i>Bromus carinatus</i>) Zacate bahía (<i>Paspalum notatum</i>) Zacate pitillo (<i>Ixophorus unisetus</i>) Zacate agrarista (<i>Cynodon dactylon</i>)	0.5-1.0		Cebolla: 0.2 Ajo y cebollín: 0.01
Alfalfa (21)	Bromo (<i>Bromus carinatus</i>) Zacate casamiento (<i>Eragrostis mexicana</i>) Pasto alambre (<i>Sporobolus indicus</i>) Zacate agrarista (<i>Cynodon dactylon</i>)			0.01
Lechuga (28)	Zacate Bromo (<i>Bromus carinatus</i>) Zacate casamiento (<i>Eragrostis mexicana</i>) Pasto alambre (<i>Sporobolus indicus</i>)	0.5 - 1.0	Aplíquese sobre maleza en estado vegetativo, hasta antes de la floración de ésta. Cuando la maleza sea predominante.	0.01
Cacahuete (80)	Pasto alambre (<i>Sporobolus indicus</i>)	0.5 - 1.0		
	Zacate de agua (<i>Echinochloa crus-galli</i>)	1.0 - 1.5		

CULTIVO	MALEZAS	DOSIS (L/ha)	OBSERVACIONES	LMR (ppm)* Haloxifop-R-me- til éster
Piña (40)	Zacate frente de toro (<i>Digitaria sanguinalis</i>) Zacate amargo (<i>Digitaria insularis</i>) Zacate caracolillo o guatemalteco (<i>Eragrostis ciliaris</i>)	2- 3	Es un herbicida selectivo al cultivo de piña en todas sus etapas, por lo que se debe realizar una aplicación en post-emergencia en cualquier momento en que las malezas de hoja angosta (pastos) se presenten de manera abundante. Preferentemente aplicar cuando los pastos tengan de 10 a 20 cm de altura y en etapa de crecimiento activo, con buena humedad en el suelo. Aplíquelo bajo las prácticas y equipos comúnmente usados en este cultivo (manuales y de tractor) manteniendo las dosis recomendadas en la etiqueta.	0.01
Soya (60)	Zacate horquetilla (<i>Brachiaria plantaginea</i>)	1.0	Se debe realizar una aplicación sobre la maleza en estado vegetativo hasta antes de la floración de esta.	0.5
	Alpistillo (<i>Phalaris minor</i>) Zacate liendrilla (<i>Leptochloa filiformis</i>)	0.5 - 1.0		
Agave (21)	Pasto rosado (<i>Rhynchelytrum</i> sp.) Zacate conejo (<i>Panicum reptans</i>)	0.5	Realizar una aplicación en post-emergente a la maleza.	Exento
	Zacate de agua (<i>Echinochloa cruz-galli</i>)	1.5		
Palma Aceitera (28)	Pasto humicicola (<i>Brachiaria humicicola</i>)	1.0 - 2.0	Aplicar en postemergencia a la maleza y al cultivo.	0.01

Periodo de reentrada: 12 hr

(): Intervalo de Seguridad: días que deben transcurrir entre la última aplicación y la cosecha.

Contraindicaciones:

Los herbicidas ariloxifenoxi son productos sumamente activos y una mínima cantidad puede dañar a las plantas de hojas angosta, tanto en el periodo de crecimiento como en el de inactividad. No se aplique este producto directamente ni se permita que sus vapores o gotitas de las aspersiones caigan sobre cultivos de gramíneas y otras plantas útiles que sean susceptibles a los ariloxifenoxiaril (haloxifop). Debido a la dificultad en lograr limpieza absoluta de los equipos en la aplicación de productos a base de ariloxifenoxi, se recomienda no usar dichos aparatos para la aplicación de otros productos agroquímicos. Evite las aplicaciones de Galant™ Ultra cuando se esperen lluvias en los próximos 30 minutos, ya que este, es el tiempo necesario para que el herbicida penetre en la maleza y ejerza su acción. No aplique con velocidad de viento superior a 8 km/hr ya que con velocidades superiores, la deriva del producto podría dañar cultivos aledaños susceptibles. El tipo de terreno no afecta la efectividad de Galant™ Ultra, ya que este es un herbicida de aplicación en postemergencia temprana sobre maleza de hoja angosta, por lo que no se ve afectado por el tipo de suelo en el que se aplique.

Fitotoxicidad:

Este producto no es fitotóxico a los cultivos aquí indicados si se aplica de acuerdo a las recomendaciones de la etiqueta.

Incompatibilidad:

No se recomienda Galant™ Ultra en mezcla de tanque. Si se desea mezclar, la mezcla se hará con productos registrados en los cultivos recomendados en la etiqueta, sin embargo, es necesario realizar una prueba de compatibilidad y Fitotoxicidad previa a la aplicación.

Manejo de resistencia:

Para prevenir el desarrollo de poblaciones resistente, siempre respete las dosis y las frecuencias de la aplicación; evite el uso repetido de este producto, alternándolo con otros grupos químicos de diferentes modos de acción y diferentes mecanismos de detoxificación y mediante el apoyo de otros métodos de control.



RED DE CUSTODIA
PROTEGIENDO NUESTRO FUTURO

Conozca más de nuestro programa en: www.reddecustodia.com



Registro Sanitario: RSCO-HEDE-0201Q-0301-009-010.51.
Banda Precautoria: Verde
Categoría toxicológica: 5
Titular del registro: Dow AgroSciences de México, S.A. de C.V.

Para cuidar su salud y garantizar la efectividad del producto lea y entienda las instrucciones de la etiqueta antes de usar el producto.

Este producto puede ser nocivo, si no se usa de acuerdo a las recomendaciones establecidas en la etiqueta.

Fecha de actualización: Abril 2020