

FICHA TÉCNICA

IMIDACLOPRID 350 SC®

Insecticida agrícola

Suspensión concentrada

Producto registrado: **REG. RSCO-INAC-0199-X0131-064-29.89**

COMPOSICIÓN PORCENTUAL	% EN PESO
INGREDIENTE ACTIVO:	
IMIDACLOPRID: (E)-1-(6-cloro-3-piridilmetil)-N-nitroimidazolidin-2-ilideneamina. (Equivalente a 350 g de i.a./L a 20°C)	29.89
INGREDIENTES INERTES:	
Humectante, antiespumante, dispersante, espesante, diluyente, impurezas y compuestos relacionados.	70.11
TOTAL	100.00



**NOCIVO EN CASO DE INGESTIÓN
NOCIVO SÍ SE INHALA**

CATEGORÍA TOXICOLÓGICA: **4, PRECAUCIÓN. BANDA AZUL.**

ALTO, LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO

INSTRUCCIONES DE USO SIEMPRE CALIBRE SU EQUIPO DE APLICACIÓN

IMIDACLOPRID 350 SC® es recomendado para el control de las plagas indicadas en cada cultivo en el siguiente cuadro.

CULTIVO	PLAGA	DOSIS L/ha	OBSERVACIONES
Aguate (14)*	Mosca blanca (<i>Paraleyrodes perseae</i>)	450 - 600 ml/ha	Realizar una aplicación al follaje; volumen de aplicación 950 – 1050 L de agua/ha.
Calabacita (21) Calabaza (21) Melón (21) Pepino (21) Sandía (21)	Mosquita blanca (<i>Bemisia tabaci</i>)	1.0-1.25	Realizar dos aplicaciones al follaje, a intervalo de 9 días; volumen de aplicación 350 L de agua /ha.

Chile (21)	Mosquita blanca (<i>Bemisia tabaci</i>)	0.90-1.0	Realizar una aplicación dirigida al follaje; volumen de aplicación 450-550 L de agua/ha.
Jitomate (21)	Mosquita blanca (<i>Bemisia tabaci</i>)	1.10- 1.25	Realizar una aplicación al follaje; volumen de aplicación de 385 – 485 L de agua por ha.
Lima (SL) Limonero (SL) Mandarino (SL) Naranja (SL) Tangerino (SL) Toronjo (SL)	Psílido Asiático de los cítricos (<i>Diaphorina citri</i>)	35 – 40 ml/100 L de agua	Realizar una aplicación al follaje.

***() Intervalo de seguridad:** Días que deben transcurrir entre la última aplicación y la cosecha y SL= Sin Límite.

TIEMPO DE REENTRADA A LAS ZONAS TRATADAS: 24 horas después de la aplicación.

LMR (Límite máximo de residuos):

CULTIVO	LMR (mg/kg)	FUENTE
Calabacita Calabaza Melón Pepino Sandía	0.5	EPA*
Chile	1.0	EPA
Jitomate	1.0	EPA
Lima (SL) Limonero (SL) Mandarino (SL) Naranja (SL) Tangerino (SL) Toronjo (SL)	0.70	EPA

* Environmental Protection Agency

MÉTODOS PARA PREPARAR Y APLICAR EL PRODUCTO. Agite el envase del producto antes de abrirlo. Con el equipo de protección puesto, abra el envase, desenroscando la tapa hasta romper el sello de seguridad exterior y retírela totalmente, invierta la tapa y colóquela en la parte superior de la boca del envase, insertando la pestaña sobre el sello de seguridad interior, gire varias veces hasta romper este sello. Realice esta operación con mucho cuidado a fin de evitar salpicaduras y el contacto con la piel y ojos. Mida con una probeta de plástico, o con algún otro utensilio graduado específico para este uso, la cantidad de producto a utilizar. Haga una pre-mezcla con la cantidad de producto necesario, para lo cual llene con agua la mitad del tanque (tambo) o depósito de la aspersora, agregue la dosis recomendada del producto, agite perfectamente y adicione la cantidad de agua restante. Agite continuamente. Aplique la mezcla el mismo día en que la prepare.

CONTRAINDICACIONES. No se debe aplicar en horas de calor intenso ni cuando la velocidad del viento sea mayor de 15 km/hr.

FITOTOXICIDAD: Este producto no es fitotóxico a las dosis y en los cultivos recomendados en esta etiqueta.

INCOMPATIBILIDAD. No mezclar con otros productos, aplíquese solo.

“MANEJO DE RESISTENCIA”: “PARA PREVENIR EL DESARROLLO DE POBLACIONES RESISTENTES, SIEMPRE RESPETE LAS DOSIS Y LAS FRECUENCIAS DE APLICACIÓN; EVITE EL USO REPETIDO DE ESTE PRODUCTO, ALTERNÁNDOLO CON OTROS GRUPOS QUÍMICOS DE DIFERENTES MODOS DE ACCIÓN Y DIFERENTES MECANISMOS DE DESTOXICACIÓN Y MEDIANTE EL APOYO DE OTROS MÉTODOS DE CONTROL”.