



Tiametoxam + Lambda Cihalotrina

Insecticida / Suspensión acuosa

RSCO-INAC-0102U-0177-X347-008-22.09

RAI

COMPOSICIÓN PORCENTUAL

% EN PESO

INGREDIENTE ACTIVO:

Tiametoxam: (EZ)-3-(2-cloro-1,3-tiazol-5-ilmetil).....12.61%

-5-metil-1,3,5-oxadiazinan-4-ilideno(nitro)amina

(Equivalente a 141 g de i.a. / L a 20 °C)

Lambda Cihalotrina: (R)-a-ciano-3-fenoxibencil (1S)-cis-3-.....9.48%

[(Z)-2-cloro-3,3,3-trifluoropropenil]-2,2-dimetilciclopropano-

carboxilato y (S)-a-ciano-3-fenoxibencil (1R)-cis-3-[(Z)-2-cloro

-3,3,3-trifluoropropenil]-2,2-dimetilciclopropanocarboxilato

(Equivalente a 106 g de i.a. / L a 20 °C)

INGREDIENTES INERTES:

Dispersante, emulsificante, encapsulante, anticongelante,77.91%

espesante, conservador y solventes

TOTAL: 100.0%



NOCIVO EN CASO DE INGESTIÓN

NOCIVO SI SE INHALA

“ALTO LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”

“INSTRUCCIONES DE USO”

“SIEMPRE CALIBRE SU EQUIPO DE APLICACIÓN”

INFORMACIÓN GENERAL:

LEAO es un insecticida químico que se recomienda para aplicación en los cultivos y para las plagas aquí indicadas.

CULTIVO	PLAGA NOMBRE COMÚN / NOMBRE CIENTÍFICO	DOSIS (ML/HA)	OBSERVACIONES
Jitomate			
Tomate de cáscara			
Chile			
Chile bell	Pulgón saltador (<i>Paratrioza cockerelli</i>)	200-300	Realizar tres aspersiones al follaje, a
Berenjena	Mosquita blanca (<i>Bemisia tabaci</i>)		intervalo de 7 días. Volumen de aplicación
Papa			550 – 650 L de agua/ha.
(SL)			

TIEMPO DE REENTRADA A LAS ZONAS TRATADAS: 8 horas

() INTERVALO DE SEGURIDAD: Días que deben transcurrir entre la última aplicación y la cosecha.

SL: Sin límite

MÉTODO PARA PREPARAR Y APLICAR EL PRODUCTO

Siempre use el equipo de protección. Abra el envase de **LEAO** girando la tapa hasta romper el arillo de seguridad, con la misma tapa de forma invertida colóquela sobre el sello de seguridad presionando y girándola para romper totalmente el sello (no use la boca para abrir este envase). Mida con probeta la dosis recomendada y diluya en agua vertiendo la dosis previamente medida. El mezclado o agitado se realiza por medio de la recirculación en el equipo de aplicación. Este material se deberá de aplicar el mismo día que se aplica la mezcla.

CONTRAINDICACIONES

Evite aplicar **LEAO** durante los periodos de alta temperatura (mayor a 28 °C) y alta radiación, o cuando exista alta probabilidad de lluvia. No aplicar con vientos superiores a 10 km/h o cuando exista la presencia de rocío sobre el follaje.

FITOTOXICIDAD

LEAO no es fitotóxico a las dosis y en los cultivos aquí indicados, si es aplicado de acuerdo a lo recomendado.

INCOMPATIBILIDAD

LEAO no deberá mezclarse con otros productos.

PRESENTACIÓN: 200ML, 950ML.