



FICHA TÉCNICA

THIAMETHOXAM + LAMBDA CYHALOTRINA

Insecticida / Suspensión acuosa

No. Registro: RSCO-INAC-0102U-0177-X347-008-22.09

COMPOSICIÓN PORCENTUAL

Porcentaje

Tiametoxam:

(EZ)-3-(2-cloro-1,3-tiazol-5-ilmetil)-5-metil-1,3,5-oxadiazinan-4-ilideno(nitro)amina.....12.61 %
(Equivalente a 141 g de i.a. / L a 20 °C)

Lambda Cihalotrina:

(R)-a-ciano-3-fenoxibencil (1S)-cis-3-[(Z)-2-cloro-3,3,3-trifluoropropenil]-2,2-dimetilciclopropanocarboxilato y (S)-a-ciano-3-fenoxibencil (1R)-cis-3-[(Z)-2-cloro-3,3,3-trifluoropropenil]-2,2-dimetilciclopropanocarboxilato.....9.48 %
(Equivalente a 106 g de i.a. / L a 20 °C)

INERTES

Dispersante, emulsificante, encapsulante, anticongelante, espesante, conservador y solventes....77.91 %

TOTAL.....100.00 %



LEAO THIAMETHOXAM + LAMBDA CYHALOTRINA

es un insecticida químico que se recomienda para aplicación en los cultivos y para las plagas aquí indicadas.

CULTIVO	INTERVALO DE SEGURIDAD	PLAGA	DOSIS (mL/ha)	OBSERVACIONES
JITOMATE, TOMATE DE CÁSCARA, CHILE, CHILE BELL, BERENJENA, PAPA	SIN LÍMITE	PULGÓN SALTADOR (<i>Paratrioza cockerelli</i>) MOSQUITA BLANCA (<i>Bemisia tabaci</i>)	200 – 300	Realizar tres aspersiones al follaje, a intervalo de 7 días. Volumen de aplicación 550 – 650 L de agua/ha.

INTERVALO DE SEGURIDAD:

Días que deben transcurrir entre la última aplicación y la cosecha. El tiempo de reentrada a las zonas tratadas: **8 horas**.

PROPIEDADES FÍSICAS

Rango de pH (Dispersión acuosa al 1%) (MT 75.3, CIPAC Handbook J)

Rango de pH: 5.0 a 8.0.

Suspensibilidad de Lambda-Cihalotrina (MT 184, CIPAC Handbook K)

Un mínimo del 90% del contenido de Lambda-Cihalotrina encontrado en el punto 2.2 deberá estar en suspensión después de 30 minutos en agua estándar CIPAC D a 30 °C ± 2 °C.

Suspensibilidad de Tiametoxam (MT 184, CIPAC Handbook K)

Un mínimo del 90% del contenido de Tiametoxam encontrado en el punto 2.3 deberá estar en suspensión después de 30 minutos en agua estándar CIPAC D a 30 °C ± 2 °C. Prueba de tamiz húmedo (MT 185, CIPAC Handbook K)

Se debe retener un máximo de 0.2% p/p en un tamiz de prueba de 75 µm.

FITOTOXICIDAD:

LEAO THIAMETHOXAM + LAMBDA CYHALOTRINA no es fitotóxico a las dosis y en los cultivos aquí indicados, si es aplicado de acuerdo a lo recomendado en esta etiqueta.

INCOMPATIBILIDAD:

LEAO THIAMETHOXAM + LAMBDA CYHALOTRINA no deberá mezclarse con otros productos.