



LEGACY®



Mesotriona

Herbicida / Suspensión concentrada

RSCO-HEDE-0201T-X0160-064-40.0

AGC

COMPOSICIÓN PORCENTUAL

% EN PESO

INGREDIENTE ACTIVO:

Mesotriona: 2-(4-metil-2-nitrobenzilo)ciclohexano-1,3-diona

(Equivalente a 480 g de i.a./L a 20°C)40.00%

INGREDIENTES INERTES:

Anticongelante, Espesante, Dispersante

y Diluyente 60.00%

TOTAL 100.0%

NOCIVO SI SE INHALA

“ALTO LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”

“INSTRUCCIONES DE USO”

“SIEMPRE CALIBRE SU EQUIPO PARA SU APLICACIÓN”

INFORMACIÓN GENERAL:

LEGACY Es un herbicida que se utiliza para el control post emergencia de maleza en los cultivos que a continuación se mencionan.

CULTIVO	NOMBRE COMÚN	MALEZAS NOMBRE CIENTÍFICO	DOSIS ML/HA	OBSERVACIONES
Caña de azúcar (181)	Coquillo Quelite Quiebraplato Duraznillo Alache Enredadera	(<i>Cyperus esculentus</i>) (<i>Amaranthus hybridus</i>) (<i>Ipomoea purpurea</i>) (<i>Solanum nigrum</i>) (<i>Anoda cristata</i>) (<i>Convolvulus arvensis</i>)	250 - 350	Realizar una aplicación foliar en postemergencia temprana a la maleza y al cultivo; volumen de aplicación 350-450 L/ha.
Maíz, Sorgo (SL)	Coquillo Sanguinaria Falsa altamisa Zacate cola de zorra Gigantón	(<i>Cyperus esculentus</i>) (<i>Polygonum aviculare</i>) (<i>Parthenium hysterophorus</i>) (<i>Leptochloa filiformis</i>) (<i>Tithonia tubaeaeformis</i>)	250 - 350	Realizar una aplicación foliar en post-emergencia temprana a la maleza y al cultivo; volumen de aplicación 350-450 L de agua /ha.

() INTERVALO DE SEGURIDAD: días que deben transcurrir entre la última aplicación y la cosecha.

TIEMPO DE REENTRADA A LA ZONA TRATADA: 24 horas después de la última aplicación.

CONTRAINDICACIONES:

LEGACY deberá aplicarse en condiciones climáticas favorables. No se aplique en horas de calor intenso, o de máxima insolación. No aplicar si se sospecha de la presencia de lluvia en las horas inmediatas a la aplicación.

INCOMPATIBILIDAD:

LEGACY es compatible con la mayoría de los productos registrados para el cultivo de caña. Siempre realice una prueba antes de realizar la mezcla.

MANEJO DE RESISTENCIA:

PARA PREVENIR EL DESARROLLO DE POBLACIONES RESISTENTES, SIEMPRE RESPETE LAS DOSIS Y LAS FRECUENCIAS DE APLICACIÓN; EVITE EL USO REPETIDO DE ESTE PRODUCTO, ALTERNÁNDOLO CON OTROS GRUPOS QUÍMICOS DE DIFERENTES MODOS DE ACCIÓN Y DIFERENTES MECANISMOS DE DESTOXIFICACIÓN Y MEDIANTE EL APOYO DE OTROS MÉTODOS DE CONTROL.

MÉTODO DE PREPARACION Y APLICACIÓN DEL PRODUCTO:

Durante el uso y manejo de este producto utilizar el equipo de protección señalado. Con el equipo de seguridad puesto antes de usar el producto agite el envase. Abra cuidadosamente el envase rompiendo el sello de garantía y antes de verter el producto al equipo de aplicación, realice una premezcla, en un recipiente limpio por separado, agregue agua hasta un tercio de su capacidad incorpore lentamente la cantidad de **LEGACY** a utilizar, agitando continuamente hasta obtener una mezcla uniforme. Sin dejar de agitar vierta la premezcla en el tanque de mezclado. Agregue agua (libre de sedimentos) hasta la totalidad de la capacidad del tanque, sin dejar de agitar, a fin de homogeneizar la mezcla y aplicar de inmediato. Calibre su equipo

de aplicación. Utilice el volumen de agua necesario para lograr una buena cobertura del área a tratar.

FITOTOXICIDAD:

LEGACY no es fitotóxico en los cultivos aquí indicados, si se aplica de acuerdo a las especificaciones.

PRESENTACIONES DISPONIBLES:

350 ML