

## METALOSATE® MULTIMINERAL™

### ANÁLISIS GARANTIZADO:

|                                       | (p/p) |
|---------------------------------------|-------|
| Calcio (Ca).....                      | 1,0%  |
| (Quelato de aminoácido de Calcio)     |       |
| Magnesio (Mg).....                    | 1,0%  |
| (Quelato de aminoácido de Magnesio)   |       |
| Cobre (Cu).....                       | 0,5%  |
| (Quelato de aminoácido de Cobre)      |       |
| Hierro (Fe).....                      | 0,5%  |
| (Quelato de aminoácido de Hierro)     |       |
| Manganeso (Mn).....                   | 0,5%  |
| (Complejo de aminoácido de Manganeso) |       |
| Molibdeno (Mo).....                   | 0,1%  |
| (Complejo de aminoácido de Molibdeno) |       |
| Zinc (Zn).....                        | 0,5%  |
| (Quelato de aminoácido de Zinc)       |       |

### INFORMACIÓN GENERAL:

El Quelato Aminoácido **Metalosate® Multimineral™** está diseñado para ser incluido en un programa regular de fertilización foliar para prevenir o corregir deficiencias nutricionales que puedan limitar el crecimiento de los cultivos. Es soluble en agua y no tóxico para las plantas cuando se aplique correctamente. Para mejores resultados aplíquese **Metalosate® Multimineral™** de acuerdo a las recomendaciones basadas en el análisis foliar y análisis del suelo.

### INSTRUCCIONES:

Agítese bien antes de usar. No se deje congelar.

Dilúyase una parte de **Metalosate® Multimineral™** en un mínimo de 20 partes de agua. La aplicación debe cubrir completamente a las plantas. El uso de un surfactante no-iónico mejorará la cobertura y la eficacia de la aplicación. Se recomienda aplicar temprano por la mañana o al final de la tarde. No se use sin diluir.

El **Metalosate® Multimineral™** puede ser incluido en un programa regular de fertilización foliar de los cultivos. Consulte a un representante de **Albion®** o su distribuidor acerca de su compatibilidad con otros productos.

El **Metalosate® Multimineral™** puede usarse en hortalizas, granos, tubérculos, cucurbitáceas, plantas ornamentales, árboles y arbustos frutales, frutos tropicales y subtropicales, cafetales, viñedos, y otros cultivos.

### RECOMENDACIONES:

**Puede utilizarse en toda clase de cultivos tales como:** Arroz, Maíz, Trigo, Cebada, Papa, Tomate, Leguminosas, Cucurbitáceas, Ají, Berenjena, Ajo, Cebolla, Tabaco, Crucíferas, Melón, Sandía y otros: Aplíquese 1,0 a 2,0 L/Ha por aplicación, durante todas las etapas fenológicas del cultivo. La aplicación podrá repetirse dos o más veces durante el cultivo.

**Es recomendado para frutales tales como:** Manzano, Pera, Cerezo, Duraznos, Cítricos, Aguacate/Palto, Banano, Piña, Papaya, Arándano, Frutilla, Uva de Mesa, y otros: Aplíquese 1,0 a 2,0 L/Ha por aplicación durante todas las etapas fenológicas del cultivo. La aplicación podrá repetirse con intervalos de 2 a 4 semanas durante el cultivo.

**Ornamentales y Césped:** Dilúyase en un mínimo de 1,0 a 2,0 L/100 L de agua y aplíquese a cobertura completa.

La dosis dependerá del cultivo, del estado de crecimiento y de la severidad de la deficiencia. La dosis máxima es para plantas maduras. Reduzca la dosis de aplicación proporcionalmente al tamaño de las plantas pequeñas.

### PERIODO DE ESPERA Y DE REINGRESO:

Puede ingresar inmediatamente a las áreas tratadas.

### GARANTÍA:

La responsabilidad del vendedor está limitada a reemplazar un producto defectuoso. **EL FABRICANTE Y/O VENDEDOR NO SERÁ RESPONSABLE POR CUALQUIER DAÑO O PÉRDIDA, DIRECTA O CONSECUENTE POR USO INDEBIDO O INCAPACIDAD DE APLICAR ESTE PRODUCTO. CUALQUIER OTRA GARANTÍA EXCEPTUANDO LAS ESCRITAS POR EL FABRICANTE, YA SEA EXPRESA O IMPLÍCITA, SERÁ RECHAZADA.**

Albion, el logo de Albion, Metalosate, y Multimineral son marcas comerciales de Albion Laboratories, Inc.

Fabricado por:

**Albion Laboratories, Inc.**  
101 North Main Street  
Clearfield, Utah 84015  
U.S.A.