



Micro Soil Control

LÍQUIDO SOLUBLE

¿POR QUÉ UTILIZAR MICRO SOIL CONTROL?


Micro Soil Control es un producto microbiológico superconcentrado recomendado para el control y manejo de enfermedades causadas por hongos del suelo. Su formulación contiene la cepa *Trichoderma harzianum* con amplio espectro de acción, altamente efectiva sobre enfermedades de raíz como *Fusarium*, *Rhizoctonia*, *Phytophthora*, *Phymatotrichum*, *Monosporascus* y *Verticillium*, entre otras.

Micro Soil Control presenta una gran capacidad de reproducción y excelente velocidad de población y repoblación de *Trichoderma* que se vuelve altamente voraz al confrontar hongos fitopatógenos ejecutando rápidamente el hiperparasitismo.

Micro Soil Control degrada directamente los hongos fitopatógenos alimentándose de estos. Actúa por tres mecanismos de protección: competencia, antagonismos y parasitismo. Además tiene efecto de bioestimulación, incremento general del sistema radicular.

BENEFICIOS

- Acción inductora de resistencia activa a enfermedades foliares.
- Amplio rango de control de hongos y bacterias fitopatógenos.
- Equilibra la regeneración de tejidos y disminuye el estrés.
- Posee una amplia gama de vías de combate contra enfermedades.
- Genera resistencia sistemática en la planta.



más Resultados
al menor costo



agribest.com.mx





Micro Soil Control

COMPOSICIÓN PORCENTUAL

%(P/V)

Trichoderma harzianum (1x10 ⁷ UFC/mL)	50.00%
Ácidos húmicos	5.00%
Diluyentes	45.00%
Total	100.00%

CARACTERÍSTICAS FÍSICOQUÍMICAS:

Densidad (g/mL): 0.93 + 0.1 ; pH: 5.0 + 1.0

INSTRUCCIONES DE USO:

PLAGA	CULTIVO	DOSIS	FRECUENCIA DE APLICACIÓN
Damping off (Pythium aphanidermatum)	Charolas y almácigos.	1.0 L / 200 L de agua 1.0 - 1.5 L / 200 L de agua	1 aplicación como preventivo. 2 a 3 aplicaciones con intervalo de 15 días entre la primera y la segunda aplicación y 21 días entre la segunda y tercera.
Fusarium (Fusarium oxysporum)	Agave, aguacate, fresa, zarzamora, frambuesa, tomate rojo, tomate de cáscara, pepino, papaya, chicharo, calabaza, melón, sandía.	1.0 L / ha 1.5 - 2.0 L / ha	1 aplicación como preventivo. 2 a 3 aplicaciones con intervalo de 15 días entre la primera y la segunda aplicación y 21 días entre la segunda y tercera.
Rhizoctonia (Rhizoctonia solani)	Chile, tomate verde, tomate rojo, papa, pepino, calabaza, melón, sandía, aguacate.	1.0 L / ha 2.0 L / ha	1 aplicación como preventivo. 2 aplicaciones con intervalo de 15 días entre la primera y la segunda aplicación.
Esclerotinia (Sclerotium cepivorum)	Cebolla.	1.0 L / ha 1.5 - 2.0 L / ha	1 aplicación como preventivo. 2 aplicaciones con intervalo de 15 días entre la primera y la segunda aplicación.

Esclerotinia (Sclerotinia sclerotiorum)	Tomate rojo, tomate de cáscara, pepino, sandía, calabaza, melón, papaya, chícharo.	1.0 L / ha	1 aplicación como preventivo.
		1.5 - 2.0 L / ha	2 aplicaciones con intervalo de 18 días entre la primera y la segunda aplicación.
Phytophthora cinnamomi	Aguacate	1.0 L / ha	1 aplicación como preventivo.
		2.0 - 3.0 L / ha	2 aplicaciones con intervalo de 14 días entre la primera y la segunda aplicación.
Phytophthora capsici	Chile, tomate verde, tomate rojo, papa.	1.0 L / ha	1 aplicación como preventivo.
		1.5 - 2.0 L / ha	2 aplicaciones con intervalo de 18 días entre la primera y la segunda aplicación.
v Phytophthora infestans	Chile, tomate verde, tomate rojo, papa, papaya.	1.0 L / ha	1 aplicación como preventivo.
		1.5 - 2.0 L / ha	2 aplicaciones con intervalo de 18 días entre la primera y la segunda aplicación.
Phytophthora parasítica	Limón.	1.0 L / ha	1 aplicación como preventivo.
		2.0 - 3.0 L / ha	2 aplicaciones con intervalo de 18 días entre la primera y la segunda aplicación.
Pythium	Tomate rojo, tomate de cáscara, pepino, melón, calabaza, sandía, papaya, chícharo.	1.0 L / ha	1 aplicación como preventivo.
		1.5 - 2.0 L / ha	2 aplicaciones con intervalo de 14 días entre la primera y la segunda aplicación.

MÉTODO PARA PREPARAR Y USAR EL PRODUCTO

Antes de abrir el envase, agite perfectamente el producto, abra con cuidado el envase, mida la cantidad indicada y viértala en un recipiente conteniendo los litros de agua limpia necesarios, mézclese de manera correcta y aplique inmediatamente.

Siempre calibre el equipo de aplicación; agite el producto vigorosamente antes de abrirlo.

MÉTODO PARA APLICAR EL PRODUCTO

- Aplicación foliar.
- Aplicar con mochila manual o motorizada, con boquilla de cono hueco con bajo volumen de descarga.
- Se recomienda en la aplicación asperjar hasta punto de goteo en el haz y envés de la hoja.
- Se sugiere aplicación por la mañana o por la tarde, los días nublados favorecen la efectividad.
- Dos horas posteriores a su aplicación en condiciones controladas o protegidas como invernaderos se sugiere evitar ventilación.
- Puede agregar coadyuvantes a base de sales potásicas o jabones agrícolas para reforzar la adherencia y residualidad del producto.

INCOMPATIBILIDAD

Micro Soil Control es compatible con la mayoría de los agroquímicos. Sin embargo, se sugiere hacer pruebas antes de realizar mezclas.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE

- No coma, beba o fume cuando esté utilizando este producto.
- No se transporte o almacene junto con productos alimenticios o ropa.
- Manténgase fuera del alcance de los niños.
- Lávese las manos después de utilizar el producto.
- Dispóngase de los envases vacíos conforme al reglamento de la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, en materia de residuos peligrosos.

TOXICIDAD

Micro Soil Control no es fitotóxico a las concentraciones, etapas y formas de aplicación recomendadas en la etiqueta. Categoría toxicológica: 5. Verde.

