



Ficha técnica – Productos Fitosanitarios

Oberon®

Insecticida – Acaricida / Suspensión concentrada

GRUPO

23

INSECTICIDA

DATOS GENERALES DEL PRODUCTO

Ingrediente activo:

Spiromesifen

Composición porcentual:

Ingrediente activo:	% en peso
Spiromesifen: 3-Mesitil-2-oxo-1-oxaspiro[4,4]non-3-en-4-il 3,3-dimetilbutirato.....	22.86
(Equivalente a 240 g de i.a./L a 20°C)	
Ingredientes inertes: diluyente, humectante, dispersante, anticongelante y antiespumante.....	77.14
TOTAL	100.00

Categoría toxicológica:

5 Precaución

No. de Registro:

RSCO-INAC-01030-301-064-023

USOS

CULTIVO	PLAGA	DOSIS L/HA	OBSERVACIONES
Maíz (5) para maíz forrajero (10) para maíz grano	Araña roja <i>Tetranychus urticae</i>	0.4 – 0.8	Aplicar cuando se detecten las primeras arañas rojas, dirigir la aplicación al haz y envés de las plantas buscando lograr una buena cobertura. El volumen de aplicación deberá ser de 500 L/ha.
Pepino Melón Sandía Calabaza Calabacita (7)	Mosca blanca (ninfas) <i>Bemisia argentifolii</i>	0.3 - 0.5	Aplique cuando se detecten las primeras ninfas de mosca blanca y/o ácaros. Repetir en caso necesario a intervalos de 7 días.
	Mosca blanca (ninfas) <i>Trialeurodes vaporariorum</i>	0.4 - 0.6	
Algodonero (30)	Mosca blanca (ninfas) <i>Bemisia argentifolii</i>	0.4 a 0.6	Es muy importante lograr una buena cobertura del cultivo, principalmente en la parte inferior de las plantas y en el envés de las hojas, que es donde se encuentran los ácaros, las ninfas de mosca blanca y pulgón saltador.
Papa (7)	Mosca blanca (ninfas) <i>Trialeurodes vaporariorum</i> Araña roja <i>Tetranychus urticae</i>	0.4 a 0.6	

Oberon®

Página 1 de 3

Bayer de México, S.A. de C.V., División Crop Science, garantiza que el contenido de ingredientes activos y contenido neto del producto corresponden a lo indicado en la etiqueta del producto. Como el manejo, transporte, almacenaje, dosificación y aplicación de este producto están fuera de nuestro control, Bayer de México, S.A. de C.V., División Crop Science, no se hace responsable del uso y resultados del producto. Los límites máximos de residuos (LMR) y tolerancias de importación para cultivos o subproductos procesados resultantes de la aplicación de este producto pueden no estar establecidos internacionalmente o pueden diferir, en otros países, de los valores establecidos en México. Para cultivos de exportación, verificar esa información antes de utilizar este producto. En caso de dudas, consultar su exportador o importador antes de aplicarlo. Última actualización: 2 de junio de 2025.

Ficha técnica – Productos Fitosanitarios

Jitomate Tomate de cáscara Chile Berenjena (1)	Mosca blanca (ninfas) <i>Trialeurodes vaporariorum</i> Araña roja <i>Tetranychus urticae</i>	0.4 a 0.6	Aplique cuando se detecten las primeras ninfas de mosca blanca y/o ácaros. Repetir en caso necesario a intervalos de 7 días. Es muy importante lograr una buena cobertura del cultivo, principalmente en la parte inferior de las plantas y en el envés de las hojas, que es donde se encuentran los ácaros, las ninfas de mosca blanca y pulgón saltador.
Papa (7)	Pulgón saltador (ninfas) <i>Bactericera cockerelli</i>	0.4 – 0.6	
Berenjena Chile Jitomate Tomate de cáscara (1)			
Chile Jitomate Tomate de cáscara Berenjena (1)	Ácaro blanco <i>Polyphagotarsonemus latus</i>	0.3 a 0.5	
Fresa (3)	Araña roja <i>Tetranychus urticae</i>	0.9 – 1.2	
Gerbera (SL)	Mosca blanca (ninfas) <i>Trialeurodes vaporariorum</i>	0.4 – 0.5	Aplicar cuando aparezcan los primeros adultos. LMR tomados de EPA Realizar la aplicación cuando aparezcan los primeros adultos o ninfas. LMR tomados de la Unión Europea. Aplicar cuando se observen los primeros individuos de araña roja sobre las hojas y/o racimos florales. Es importante lograr una buena cobertura del cultivo, principalmente en la parte inferior de las plantas y en el envés de las hojas, así como también de los racimos florales que es donde se encuentran los ácaros. No aplicar en la etapa de fructificación. LMR tomado de la Unión Europea.
	Araña roja <i>Tetranychus urticae</i>	0.3 – 0.5	
Zarzamora Frambuesa Arándano Grosella (3)	Araña roja <i>Tetranychus urticae</i>	0.5 – 0.6	
Espárrago Cebolla Cebollín (20)	Araña roja <i>Tetranychus urticae</i>	0.5 – 0.6	
Papaya (SL)	Araña roja <i>Tetranychus urticae</i>	0.5 a 0.75	



Ficha técnica – Productos Fitosanitarios

Pepino Calabaza Calabacita Melón Sandía (7)	Mosca blanca <i>Bemisia spp.</i>	0.75 – 1.0 ml / L de agua	<u>Para uso en Agricultura Protegida:</u> Realizar un bloque de 2 aplicaciones cada 7 días.
Tomate (3) Berenjena Chile (3)	Mosca blanca <i>Bemisia tabaci</i>	0.75 – 1.0 ml / L de agua	<u>Para uso en Agricultura Protegida:</u> Realizar un bloque de 2 aplicaciones cada 7 días.

Tiempo de reentrada a las zonas tratadas: 12 h.

() I. de S.: días que deben respetarse entre la última aplicación y la cosecha.

PRESENTACIONES DISPONIBLES

500 ml y 1 L