



2,4-D + Picloram
Herbicida agrícola / Concentrado soluble
RSCO-MEZC-1219-0669-375-26.07

RAI

COMPOSICIÓN PORCENTUAL**% EN PESO****INGREDIENTE ACTIVO:**

2,4-D: Ácido (2,4-diclorofenoxi) acético
(Ecuivalente a 240 g de 2,4-D/L a 20°C) **20.58%**

Picloram: Ácido 4-amino-3,5,6-tricloropiridin-2-carboxílico
(Ecuivalente a 64 g de ácido picloram/L a 20°C) **5.49%**

INGREDIENTES INERTES:

Agente neutralizante y Disolvente **73.93%**

TOTAL: **100.0%**

**NOCIVO SI SE INHALA****“ALTO LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”****“INSTRUCCIONES DE USO”****“SIEMPRE CALIBRE SU EQUIPO DE APLICACIÓN”****INFORMACIÓN GENERAL:**

ORUS es recomendado en el cultivo y contra las malezas, aquí indicados:

CULTIVO	MALEZAS	DOSIS (L/ha)	OBSERVACIONES
Pastizal establecido en potreros (30)	Dormilona (<i>Mimosa pudica</i>) Escobilla (<i>Sida acuta</i>) Mala mujer (<i>Onidoscopus urens</i>) Malva (<i>Malva parviflora</i>) Aceitilla (<i>Bidens odorata</i>)	2.0-4.0	Realizar una aplicación en post-emergencia a la maleza y al cultivo, volumen de aplicación 330 – 430 L de agua/ha

TIEMPO DE REENTRADA A LAS ZONAS TRATADAS: 12 horas.

() INTERVALO DE SEGURIDAD: días que deben transcurrir entre la última aplicación y la cosecha.

MÉTODOS PARA PREPARAR Y APLICAR EL PRODUCTO.

Abra el envase de **ORUS** utilizando ropa de protección adecuada. Agregue la mitad de la cantidad requerida de agua al tanque, adicione la dosis completa del producto, agite y continúe la agitación mientras se agrega el resto del agua calculada en la calibración. Es importante continuar la agitación constante para mantener una solución uniforme. Calibre su equipo de aplicación. Utilice el volumen de agua necesario para lograr una buena cobertura del área a tratar.

CONTRAINDICACIONES

ORUS deberá aplicarse en condiciones climáticas favorables. No se aplique en horas de calor intenso, o de máxima insolación. No aplicar si se sospecha de la presencia de lluvia en las horas inmediatas a la aplicación.

FITOTOXICIDAD

ORUS no es fitotóxico al cultivo aquí indicado si se utiliza de acuerdo a las recomendaciones.

INCOMPATIBILIDAD

ORUS no deberá mezclarse con ningún otro producto plaguicida para su aplicación.

MANEJO DE RESISTENCIA

“PARA PREVENIR EL DESARROLLO DE POBLACIONES RESISTENTES, SIEMPRE RESPETE LAS DOSIS Y LAS FRECUENCIAS DE APLICACION; EVITE EL USO REPETIDO DE ESTE PRODUCTO, ALTERNÁNDOLO CON OTROS GRUPOS QUÍMICOS DE DIFERENTES MODOS DE ACCIÓN Y DIFERENTES MECANISMOS DE DESTOXIFICACIÓN Y MEDIANTE EL APOYO DE OTROS MÉTODOS DE CONTROL”.