



FICHA TÉCNICA



INSECTICIDA Y/O ACARICIDA AGRÍCOLA

Polvo soluble

Producto registrado: RSCO-INAC-0146308-003-090

COMPOSICIÓN PORCENTUAL Porcentaje en peso

Metomilo: S-Metil-N-(metil carbamoil) oxi-tio-acetamidato. (Equivalente a 900g de i.a./Kg) 90.00

INGREDIENTES INERTES 10.00
Dispersante y humectante

TOTAL 100.00

PARDO® es un insecticida carbámico de contacto. Su acción principal es contra larvas de lepidópteros. El momento más adecuado para la aplicación es cuando las larvas se encuentran en sus primeros estadios, cuando son más voraces y están más expuestas.



TÓXICO SI SE INHALA

CATEGORÍA TOXICOLÓGICA: 3 PELIGRO

ALTO, LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO

INSTRUCCIONES DE USO

SIEMPRE CALIBRE SU EQUIPO DE APLICACIÓN

CULTIVO	PLAGA	DOSIS (kg/ha)
ALGODONERO (10)	Gusano bellotero	0.3-0.4
	Gusano soldado	
	Gusano falso mediador	
	Perforador de la hoja	
	Chinche ligus	
	Gusano medidor	
ALFALFA (7)	Gusano peludo	0.3-0.35
	Gusano soldado	
	Gusano de la alfalfa	
	Picudo egipcio	
	Chinche ligus	
	Gusano trozador	
TOMATE (1)	Pulgón manchado	0.3-0.4
	Gusano alfiler	
	Gusano del fruto	
	Gusano del cuerno	
	Gusano falso mediador	
	Mosquito blanca	
MELÓN (3) SANDÍA (3) PEPINO (3)	Gusano soldado	0.13-0.4
	Gusano peludo	
	Diabrotica	
	Mosquito blanca	
	Barrenador del fruto	
	Pulgón del melón	
PAPA (14)	Chicharrita	0.3-0.4
	Palomilla de la papa	
	Pulga saltona	

CULTIVO	PLAGA	DOSIS (kg/ha)
CHILE (3)	Gusano soldado	0.3-0.4
	Barrenillo del chile	
	Chicharrita	
	Mosquito blanca	
	Trips	
	Trips	
COL (1) BROCOLI (1)	Palomilla blanca de la col	0.35-0.6
	Gusano del corazón de col	
	Diabrotica	
	Gusano falso mediador	
	Pulgón de la col	
	Diabrotica	
FRIJOL (14)	Trips	0.3-0.4
	Gusano soldado	
	Gusano del fruto	
	Diabrotica	
	Gusano del fruto	
	Gusano soldado	
SOYA (14)	Gusano peludo	0.3-0.4
	Trips	
	Diabrotica	
	Gusano del fruto	
	Gusano soldado	
	Gusano falso mediador	
TABACO (14)	Picudo	0.3-0.35
	Diabrotica	
	Gusano del cuerno	
	Gusano de la yema	
	Gusano falso mediador	
	Gusano soldado	

(i) **Intervalo de seguridad:** Días que deben transcurrir entre la última aplicación y la cosecha.

Periodo de reentrada: 24 horas después de la aplicación

MÉTODO PARA PREPARAR Y APLICAR EL PRODUCTO.

En cultivos bajos y con poco desarrollo use las dosis más bajas, en cultivos de mayor tamaño y con infestaciones fuertes use las dosis más altas. **PARDO®** debe ser diluido en agua y aplicado en forma de aspersión, usando equipo terrestre o aéreo que asegure el buen cubrimiento de las áreas infestadas. Se deberá llenar el tanque de la aspersora una cuarta parte de su capacidad, poner a funcionar el sistema de agitación y agregar la cantidad necesaria de **PARDO®**. Posteriormente añada el resto del agua y continúe agitando hasta que se disuelva completamente el producto. En aplicación aérea use de 50 a 80 litros de agua por hectárea y en aplicación terrestre utilice 200 litros de agua por hectárea. Reentrar al cultivo 24 horas después de la aplicación.

COMPATIBILIDAD.

PARDO® puede ser mezclado con otras formulaciones plaguicidas sin que pierda o reduzca sus propiedades, excepto con productos de fuerte reacción alcalina. La mezcla con otros productos deberá hacerse con aquellos que se encuentren registrados y autorizados en los cultivos aquí recomendados.

FITOTOXICIDAD.

PARDO® no es fitotóxico en las dosis recomendadas en los cultivos indicados.

CONTRAINDICACIONES No se aplique en días con vientos que arrastren el producto hacia áreas habitadas.