

Sifatec®

Portento

piriproxifeno

100 CE

Insecticida / Concentrado Emulsionable



PRESENTACIONES:

- 240 mL
- 950 mL

Insecticida regulador de crecimiento derivado de la piridina que actúa por contacto e ingestión.

INGREDIENTE ACTIVO: Piriproxifeno

CONCENTRACIÓN: 100 g de i.a/L

FORMULACIÓN: Concentrado emulsionable

CARACTERÍSTICAS DIFERENCIALES: Efectivo para el control de mosca blanca y trips en cultivos como berenjena, chile, jitomate, papa y tomate de cáscara.

ESPECTRO DE USO: Insecticida hormonal de triple acción: Larvicida-Ovicida-Esterilizante, que actúa por contacto e ingestión y presenta una elevada persistencia, que permite mantener el control sin repetir el tratamiento en la mayor parte de los casos.

Portento® 100 CE es un insecticida formulado como concentrado emulsionable. Se recomienda su uso para el control de las plagas que se indican en los siguientes cultivos:

CULTIVO	PLAGA NOMBRE COMÚN / NOMBRE CIENTÍFICO	DOSIS (ml/ha)	OBSERVACIONES
Berenjena, Chile, Jitomate, Papa, Tomate de cáscara (14)	Ninfas de mosquita blanca (<i>Bemisia argentifolii</i>) Trips (<i>Frankliniella occidentalis</i>)	300 - 500	Realizar tres aspersiones foliares a intervalos de siete días.
Arándano, Fresa, Frambuesa, Grosella, Zarzamora (14)	Trips (<i>Frankliniella occidentalis</i>)	500 - 600	Realizar tres aplicaciones a intervalos de siete días. Volumen de aplicación 350 - 450 L de agua / ha
Calabacita, Calabaza, Chayote, Melón, Pepino, Sandía (7)	Mosquita blanca (<i>Bemisia tabaci</i>) Trips (<i>Trips tabaci</i>)	400 - 600	Realizar dos aplicaciones al follaje a intervalos de siete días cuando se detecten los primeros individuos de la plaga. Volumen de aplicación 550 - 650 L de agua / ha
Algodón (28)	Mosquita blanca (<i>Bemisia tabaci</i>)	500 - 600	Realizar dos aplicaciones al follaje a intervalos de siete días cuando se detecten los primeros individuos de la plaga. Volumen de aplicación 325 - 425 L de agua / ha
Aguacate (14)	Escama blanca (<i>Hemiberlesia lataniae</i>)	500 - 750	Realizar tres aplicaciones al follaje a intervalos de siete días cuando se detecten los primeros individuos de la plaga. Volumen de aplicación 265 - 365 L de agua / ha.
	Trips (<i>Frankliniella occidentalis</i>)		Realizar tres aplicaciones al follaje a intervalos de siete días cuando se detecten presencia de la plaga. Volumen de aplicación 91 - 191 L de agua / ha

() **INTERVALO DE SEGURIDAD:** Días que deben transcurrir entre la última aplicación y la cosecha.

TIEMPO DE REENTRADA A LAS ZONAS TRATADAS: 12 horas después de la aplicación.

MÉTODO DE PREPARACIÓN Y APLICACIÓN DEL PRODUCTO: Antes de abrir el envase, agítelo para uniformizar el contenido. Desenrosque la tapa y quite con cuidado el sello protector, evitando salpicaduras y el contacto con la piel y ojos, así como su inhalación tanto al momento de la preparación como de aplicación. Calibre el equipo de aplicación para determinar el gasto de agua por hectárea a utilizar. Llene el tanque de aspersión con agua hasta la mitad. Agregue al tanque la cantidad requerida de **Portento® 100 CE** bajo agitación empleando una jarra medidora graduada. Llene finalmente el tanque con agua hasta su capacidad total agitándolo, con agitación continua.