

Sigma® Forte

Herbicida / Dispersión en aceite

DATOS GENERALES DEL PRODUCTO

Ingrediente activo:

Mesosulfurón metil + Iodosulfurón metil sódico

Composición porcentual:

Ingredientes activos:	% en peso
Mesosulfurón metil: metil 2-[(4,6-dimethoxipirimidin-2-ilcarbamoil)sulfamoil]-a-(methanesulfonamido)-p-toluate.....	1.00
(Equivalente a 10 g de i.a./L)	
Iodosulfurón metil sódico: sodio ([5-iodo-2-(methoxycarbonil)phenil]sulfonil)carbamoil)(4-methoxi-6-metil-1,3,5-triazin-2-il)azanide.....	0.20
(Equivalente a 2 g de i.a./L)	
Ingredientes inertes: Protectante, humectante, emulsificantes, solventes, buffer, espesante	98.80
TOTAL	100.00

Categoría toxicológica:

5 Precaución

No. de Registro:

RSCO-MEZC-1252-303-409-001

Descripción:

Sigma® Forte es un herbicida sistémico selectivo postemergente para el control de malezas en el cultivo de trigo. Sigma® Forte se absorbe principalmente vía foliar. La selectividad de Sigma® Forte hacia el trigo está dada por la capacidad del cultivo de metabolizar el herbicida sin sufrir daños, situación que no sucede con las malezas, las cuales son incapaces de degradarlo.

USOS

Cultivo	Malezas		Observaciones	Dosis L/ha
	Nombre común	Nombre científico		
Trigo (90)	Alpistillo	<i>Phalaris minor</i>	Realizar una aplicación en post-emergencia al cultivo y malezas. Cuando las malezas tengan de cuatro a seis hojas verdaderas y una altura de 15 cm.	1.25 - 1.5
	Alpistillo	<i>Phalaris paradoxa</i>		
	Mostaza	<i>Brassica campestris</i>		
	Mostaza negra	<i>Brassica nigra</i>		
	Lengua de vaca	<i>Rumex crispus</i>		
	Avena	<i>Avena fátua</i>		
	Quelite cenizo	<i>Chenopodium album</i>		

El tiempo de reentrada a las zonas tratadas es de 24 horas.

() I. de S. = Intervalo de seguridad. Días que deben transcurrir entre la última aplicación y la cosecha.

Ficha técnica - Productos Fitosanitarios

RESTRICCIONES DE ROTACIÓN

Cultivo	Meses entre aplicación siembra del cultivo
Maíz	5 meses
Frijol	3 meses
Cebada	4 meses
Brócoli	No se recomienda
Tomate de cáscara	3 meses

PRESENTACIONES DISPONIBLES

1 L
