

FICHA TÉCNICA STELAR X



NOMBRE COMERCIAL: STELAR X

COMPOSICION PORCENTUAL

ATRAZINA:

6-cloro-N2-etil-N4-isopropil-1,3,5-triazina-2,4-diamina 22.9% p/p

(Equivalente a 250 g de i.a. / L a 20°C)

TERBUTRINA:

N2-tert-butil-N4-etil-6-metiltio-1,3,5-triazina-2,4-diamina..... 22.9%p/p

(Equivalente a 250 g de i. á. / L a 20°C)

INGREDIENTES INERTES:

Antiespumante, espesante, dispersante, anticongelante, estabilizador y solvente..... 54.2% p/p

FAMILIA O GRUPO QUIMICO:

Los ingredientes activos de STELAR X, terbutrina y atrazina, ambos pertenecen al grupo químico de las triazinas.

REGISTRO SANITARIO COFPRIS: RSCO-MEZC-HEDE-1209-X0017-064-45.80

TIPO DEFORMULACION: Suspensión concentrada

CARACTERISTICAS FISICOQUIMICAS DEL PRODUCTO:

Densidad: 1.1g/L, pH: 6-9.

MODO DE ACCION DE STELAR X:

STELAR X es una mezcla de dos ingredientes activos: terbutrina y atrazina. Ambos pertenecen a la familia química de las atrazinas. Ambos son herbicidas sistémicos que se absorben principalmente por raíces con translocación acrópeta vía xilema y con acumulación en meristemas. La Atrazina tiene una absorción considerable por hoja. Ambos ingredientes inhiben el transporte de electrones en el fotosistema II.

USOS AUTORIZADOS DE STELAR X:

STELAR X está autorizado para su aplicación foliar en los cultivos de: **Sorgo**.

Agroquímica Tridente, S.A. de C.V.

Inglaterra 37, Parque San Andres, Coyoacan, C.P. 04040, Ciudad de México

Teléfono conmutador: (55) 9183-2400, Ventas: (55) 9183-2406, (55) 9183-2407, Fax: (55) 9183-2420, Lada: 01-800-2025-017, E-mail: tridente@prodigy.net.mx. Página web: <http://www.tridente.com.mx>

FICHA TÉCNICA STELAR X



CUADRO DE PLAGAS, DOSIS Y RECOMENDACIONES:

STELAR X es una mezcla de dos herbicidas: terbutrina y atrazina. **STELAR X** es útil para el control de las malezas de hoja ancha y angosta que a continuación se indican:

CULTIVO	PLAGA	DOSIS L/ha	OBSERVACIONES
Sorgo (SL)	Chayotillo (<i>Sycius angulatus</i>)	3.5– 5.0	Realizar la aplicación en preemergencia a la maleza y al cultivo. Volumen de aplicación: 150 – 250 L de agua/ha.
	Gusanillo (<i>Acalypha setosa</i>)		
	Malva cimarrona (<i>Anoda Cristata</i>)		
	Zacate de agua (<i>Echinochloa colonum</i>)		
	Zacate pata de gallina (<i>Paspalum pubiflorum</i>)		
	Zacate pitillo (<i>Ixophorus unisetus</i>)		

() Intervalo de Seguridad: días que deben transcurrir entre la última aplicación y la cosecha.

SL: Sin Límite

PERIODO DE REINGRESO A LOS LUGARES TRATADOS:

12 horas después de la aplicación.

MÉTODO PARA PREPARAR Y APLICAR STELAR X:

Antes de abrir el envase agite el producto, posteriormente gire la tapa de rosca y retire el sello de seguridad. Mida la cantidad de producto a utilizar en una probeta graduada. En el tanque de aplicación lleno de agua vierta la dosis recomendada del producto a utilizar. Para obtener óptimos resultados, asegure una buena cobertura en la aplicación del producto. Las dosis indicadas por hectárea deben de aplicarse en suficiente cantidad de agua según el equipo de aplicación, el tamaño y la frondosidad de las plantas. **Con aspersora manual generalmente se utilizan de 150 a 250 L de agua/ha.**

Agroquímica Tridente, S.A. de C.V.

Inglaterra 37, Parque San Andres, Coyoacan, C.P. 04040, Ciudad de México

Teléfono conmutador: (55) 9183-2400, Ventas: (55) 9183-2406, (55) 9183-2407, Fax: (55) 9183-2420, Lada: 01-800-2025-017, E-mail: tridente@prodigy.net.mx. Página web: <http://www.tridente.com.mx>

FICHA TÉCNICA STELAR X



CONTRAINDICACIONES:

No aplicar **STELAR X** en horas de calor intenso. No aplicar cuando el viento exceda los 15km/h. No aplicar cuando exista posibilidad de lluvia. No aplique en suelos alcalinos o de origen volcánico.

FITOTOXICIDAD

No es fitotóxico en el cultivo aquí indicado si se utiliza de acuerdo a las dosis y recomendaciones de la etiqueta.

MANEJO DE RESISTENCIA

“PARA PREVENIR EL DESARROLLO DE POBLACIONES RESISTENTES, SIEMPRE RESPETE LAS DOSIS Y LAS FRECUENCIAS DE APLICACIÓN; EVITE EL USO REPETIDO DE ESTE PRODUCTO, ALTERNÁNDOLO CON OTROS GRUPOS QUÍMICOS DE DIFERENTES MODOS DE ACCIÓN Y DIFERENTES MECANISMOS DE DESTOXIFICACIÓN Y MEDIANTE EL APOYO DE OTROS MÉTODOS DE CONTROL”.

EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL:

Use el equipo de protección personal (EPP) en buen estado, limpio y completo: mascarilla contra vapores tóxicos, mascarilla contra salpicaduras, gorra de algodón o sombrero, camisa de manga larga, pantalones largos, delantal tipo industrial resistente a productos químicos, lentes de seguridad, guantes y botas de neopreno. Se recomienda utilizar un overol de algodón sobre la ropa, para evitar infiltración del producto al cuerpo.

Agroquímica Tridente, S.A. de C.V.

Inglaterra 37, Parque San Andres, Coyoacan, C.P. 04040, Ciudad de México

Teléfono conmutador: (55) 9183-2400, Ventas: (55) 9183-2406, (55) 9183-2407, Fax: (55) 9183-2420, Lada: 01-800-2025-017, E-mail: tridente@prodigy.net.mx. Página web: <http://www.tridente.com.mx>