

FICHA TÉCNICA

Este documento es únicamente de carácter informativo y exclusivo para su publicación electrónica

NOMBRE COMERCIAL:	TEMPANO
TIPO:	Insecticida
FORMULACIÓN:	Polvo humectable
GRUPO QUÍMICO:	Neonicotinoides y Piretroides
INGREDIENTE ACTIVO:	Imidacloprid + Lambda cihalotrina
NOMBRE QUÍMICO:	Imidacloprid : (E)-1-(6-cloro-3-piridilmetil)-N-nitroimidazolidin-2-ilidenamina Lambda cihalotrina: (R)-α-ciano-3-fenoxibencil (1S)-cis-3-[(Z)-2-cloro-3,3,3-trifluoropropenil]-2,2-dimetilciclopropanocarboxilato y (S)-α-ciano-3-fenoxibencil (1R)-cis-3-[(Z)-2-cloro-3,3,3-trifluoropropenil]-2,2-dimetilciclopropanocarboxilato.
CONCENTRACIÓN (p/p):	Imidacloprid 22.80% (Equivalente a 228 g I.A./kg) Lambda cihalotrina: 10.00% (Equivalente a 100 g I.A./kg)
MODO Y MECANISMO DE ACCIÓN:	TEMPANO es un insecticida de aplicación foliar para la prevención y control de las plagas en los cultivos aquí indicados.
CATEGORÍA TOXICOLÓGICA (REGISTRO COFEPRIS):	Categoría Toxicológica: 4 PRECAUCIÓN

“USESE EXCLUSIVAMENTE EN LOS CULTIVOS Y PLAGAS AQUÍ RECOMENDADOS”

“INSTRUCCIONES DE USO”

“SIEMPRE CALIBRE SU EQUIPO DE APLICACIÓN”

CULTIVO	PLAGAS	DOSIS (g/Ha)	OBSERVACIONES
Brócoli Col Col de bruselas Coliflor Nabo Colza (3)	Mosquita blanca (<i>Bemisia argentifolii</i>) Pulgón (<i>Myzus persicae</i>) Gusano falso medidor (<i>Trichoplusia ni</i>)	250 - 350	Aplique cuando se observen los primeros adultos y/o ninfas de mosquita blanca. Aplique cuando se observen los primeros pulgones alados. Aplique cuando se observe los primeros síntomas de daño del gusano falso medidor sobre las plantas. Realizar 3 aspersiones al follaje a intervalos de 7 días. Utilizar un gasto de 200-250 L de agua / Ha.
Chayote Calabaza Calabacita Melón Pepino Sandía (3)	Mosquita blanca (<i>Bemisia argentifolii</i>) Pulgón (<i>Aphis gossypii</i>) Barrenador del pepino (<i>Diaphania hyalinata</i>)	250 - 350	Aplique cuando se observen los primeros adultos y/o ninfas de mosquita blanca. Aplique cuando se observen los primeros pulgones alados. Aplique cuando se observe el primer fruto con larva viva del barrenador del fruto. Realizar 3 aspersiones al follaje a intervalos de 7 días. Utilizar un gasto de 200-250 L de agua / Ha
Chile (1)	Picudo del chile (<i>Anthonomus eugenii</i>) Pulgón (<i>Myzus persicae</i>)	200 - 350	Aplique cuando se observen los primeros adultos y/o primer fruto con larva viva de picudo de chile y/o los primeros pulgones alados. Realizar 3 aspersiones al follaje a intervalos de 7 días. Utilizar un gasto de 200-250 L de agua / Ha
Berenjena Jitomate Tomate de cáscara Papa (15)	Pulgón (<i>Myzus persicae</i>)	200 - 350	Aplique cuando se observen los primeros pulgones alados. Realizar 3 aspersiones al follaje a intervalos de 7 días. Utilizar un gasto de 200-250 L de agua / Ha
Aguacate (7)	Mosquita blanca (<i>Paraleyrodes perseae</i>)	250 - 350	Aplique cuando se observen los primeros adultos de mosquita blanca. Realizar 3 aspersiones al follaje a intervalos de 7 días. Utilizar un gasto de 800-900 L de agua / Ha.
Avena (30) Cebada (30) Centeno (30) Trigo (30) Triticale (30) Arroz (30)	Pulgón de la espiga (<i>Sitobion avenae</i>) Pulgón del tallo (<i>Rhopalosiphum padi</i>)	100 - 200	Realizar una aplicación al follaje cuando se observen los primeros individuos de adultos/o ninfas de pulgón. Utilizar un gasto de 366-466 L de agua / Ha.

() **Intervalo de seguridad:** Número de días entre la última aplicación y la recolección o cosecha del cultivo. SL = Sin Límite

Tiempo de reentrada a las zonas tratadas: 12 horas

MÉTODO PARA PREPARAR Y APLICAR EL PRODUCTO

TEMPANO está formulado como polvo humectable. Abra la bolsa cortando la parte superior del envase. Pese la cantidad de producto a utilizar en una balanza en gramos. En el tanque de mezclado agregue agua limpia a tres cuartas partes del volumen a utilizar. Agregue la cantidad de **TEMPANO** a usar.

Adicione la cantidad de agua restante manteniendo la mezcla en agitación. Calibre el equipo para dar un gasto de 200 a 250 L/ha asegurando una buena cobertura.

CONTRAINDICACIONES

Aplicar cuando la velocidad del viento sea menor a 8 km y en las primeras horas de la mañana o en las últimas horas de la tarde.

FITOTOXICIDAD

No es fitotóxico a los cultivos aquí indicados, si es aplicado de acuerdo a las recomendaciones de esta etiqueta.

INCOMPATIBILIDAD

No se recomienda la mezcla de **TEMPANO** con otros productos.

MANEJO DE RESISTENCIA

"PARA PREVENIR EL DESARROLLO DE POBLACIONES RESISTENTES, SIEMPRE RESPETE LAS DOSIS Y LAS FRECUENCIAS DE APLICACION; EVITE EL USO REPETIDO DE ESTE PRODUCTO, ALTERNANDOLO CON OTROS GRUPOS QUIMICOS DE DIFERENTES MODOS DE ACCION Y DIFERENTES MECANISMOS DE DESTOXIFICACION Y MEDIANTE EL APOYO DE OTROS METODOS DE CONTROL".

NO. DE REGISTRO: RSCO-MEZC-INAC-1101H-0445-002-32.80

PRESENTACIÓN: 300 g