



FUNGICIDAS

Ficha Técnica

TROXI (Azoxistrobina)

Es un fungicida de contacto, de amplio espectro de control, que posee acción preventiva y previene la generación de resistencia.

COMPOSICIÓN PORCENTUAL

Azoxistrobina: 22.99% Equivalente en g/ L: 250 g/ L

Ingredientes Inertes: 77.10% Dispersante, humectante, anticongelante, estabilizante, conservador y diluyente.

Formulación: Suspensión concentrada

ESPECTRO DE CONTROL

Moho gris (*Botrytis cinerea*), **Antracnosis** (*Colletotrichum gleosporioides*), **Cenicilla** (*Leveillula taurica*)



MODO Y MECANISMOS DE ACCIÓN

Es un fungicida sistémico y de contacto, perteneciente al grupo químico de las estrobilurinas, con acción preventiva, curativa y antiesporulante. Está especialmente indicado para el control de enfermedades únicas en los cultivos aquí señalados.

Cultivos | Recomendaciones de uso

Cultivo	Enfermedad	Dosis	Recomendación
Zarzamora (SL) Arándano(SL) Grosella (SL) Frambuesa (SL) Fresa (SL) Vid (SL) Kiwi (SL)	Moho gris (<i>Botrytis cinerea</i>)	700 - 800 ml/ha	Realizar 2 aplicaciones al follaje a intervalo de 7 días cuando se detecte los primeros síntomas de la enfermedad, periodo de protección por al menos 14 días, volumen de aplicación sugerido 690-790 L de agua /ha.
Aguacate (SL)	Antracnosis (<i>Colletotrichum gleosporioides</i>)	600 - 700 ml/ha	Realizar 2 aplicaciones al follaje a intervalo de 7 días cuando se detecte los primeros síntomas de la enfermedad, periodo de protección por al menos 21 días, volumen de aplicación sugerido 772- 872 L de agua /ha.
Chile (SL) Tomate Verde(SL) Jitomate (SL) Papa (SL) Pimiento Morrón (SL)	Cenicilla (<i>Leveillula taurica</i>)	600 - 700 ml/ha	Realizar 2 aplicaciones al follaje a intervalos de 7 días cuando se presenten los primeros síntomas de enfermedad, volumen de aplicación sugerido 539- 639 L de agua / ha

()= Intervalo de Seguridad, días que deben transcurrir entre la última aplicación y la cosecha; SL= Sin Límite. Tiempo de reentrada a los lugares tratados, 12 hr. después de realizada la aplicación. Mantenga constante la dosis indicada, los intervalos de aplicación pueden variar dependiendo de la severidad de la maleza.

MÉTODOS PARA PREPARAR EL PRODUCTO

Agite el envase del producto antes de abrirlo. Con el equipo de protección puesto (gorra de algodón o sombrero; mascarilla contra polvos o mascarilla completa con cartucho respiratorio; lentes de seguridad para productos químicos, overol de algodón, guantes y botas de neopreno) abra el envase desenroscando la tapa hasta romper el sello de seguridad exterior y retírela totalmente, invierta la tapa y colóquela en la parte superior de la boca del envase, insertando la pestaña sobre el sello de seguridad interior, gire varias veces hasta romper este sello. Realice esta operación con mucho cuidado a fin de evitar salpicaduras y el contacto con la piel y ojos. Mida con una probeta de plástico, o con algún otro utensilio graduado específico para este uso, la cantidad de producto a utilizar.

TOXICOLOGÍA A LOS ANIMALES Y HUMANOS (DL50, CL50)

Toxicidad	Resultado
DL50	Mayor a 2000 mg/kg
DL50	Mayor a 2000 mg/kg
CL50	Menor a 5 mg/L

MÉTODOS PARA APLICAR EL PRODUCTO

Haga una pre-mezcla con la cantidad de producto necesario, para lo cual llene con agua la mitad del tanque (tambo) o depósito del aspersor, agregue la dosis recomendada del producto, agite perfectamente y adicione la cantidad de agua restante. Agite continuamente. Aplique la mezcla el mismo día en que la prepare. Aplíquese en forma de aspersión usando cualquier tipo de equipo terrestre que asegure un buen cubrimiento de las áreas infestadas.

Se recomienda hacer las aplicaciones en las primeras horas de la mañana. No se aplique en horas de calor intenso, cuando el viento sea fuerte (mayor a 15 km/hr), o cuando exista una alta probabilidad de lluvia próxima que pueda provocar el lavado del producto. No mezclar con otros productos, aplíquese solo.

IMPORTANTE: La información aquí contenida no deberá tomarse como una fuente de garantía a implícita o explícita, ni implica una responsabilidad legal, se ofrece únicamente para su consulta.