



TUCSON®

Procloraz
Fungicida concentrado emulsionable

RSCO-FUNG-0363-X0475-009-41.58

R

COMPOSICIÓN PORCENTUAL

% EN PESO

INGREDIENTE ACTIVO:

Procloraz:

N-propil-N-[2-(2,4,6-triclorofenoxi)etil]imida-ol-1-carboxamida
Equivalente a 450 g/L de i.a. a 20°C..... **41.58%**

INGREDIENTES INERTES:

Emulsificantes, cosolvente y solvente..... **58.42%**

TOTAL 100.0%



PUEDE SER NOCIVO EN CASO DE INGESTIÓN
PUEDE SER NOCIVO POR EL CONTACTO CON LA PIEL
NOCIVO SI SE INHALA

“ALTO LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”

“INSTRUCCIONES DE USO”

“SIEMPRE CALIBRE SU EQUIPO PARA SU APLICACIÓN”

1 DESCRIPCIÓN:

El material consistirá en Procloraz Técnico, disuelto en solventes adecuados, junto con cualquier otro formulador necesario. Deberá presentarse en forma de un líquido transparente estable, exento de materias suspendidas y sedimentos visibles, que se aplicará en forma de emulsión después de su dilución en agua.

INFORMACIÓN GENERAL:

TUCSON es un fungicida formulado como concentrado emulsionable utilizado para el control de las plagas mencionadas en el siguiente cuadro:

CULTIVO	PLAGAS	DOSIS	INTERVALO DE SEGURIDAD	OBSERVACIONES
Ajo Cebolla Cebollín	Mancha purpura / <i>Alternaria porri</i>	0.4- 0.6 L/ha	35 días	Realizar dos aplicaciones foliares a intervalo de 6 días, cuando se presenten los primeros síntomas de la enfermedad; volumen de aplicación sugerido 400 L de agua/ha.
Chile Jitomate	Moho gris / <i>Botrytis cinerea</i>	0.40- 0.50 L/ha	0 días	Realizar dos aplicaciones foliares a intervalo de 7 días, al observar los primeros síntomas de la enfermedad; volumen de aplicación sugerido 600 L de agua/ha.
Cebada, Trigo	Tizón foliar / <i>Helminthosporium sativum</i>	1.00- 2.50 L/ha	30 días	Realizar dos aplicaciones foliares a intervalo de 7 días, al observar los primeros síntomas de la enfermedad; volumen de aplicación sugerido 500 L de agua/ha.

TIEMPO DE REENTRADA A CAMPOS TRATADOS: 24 HORAS

() INTERVALO DE SEGURIDAD EN DÍAS QUE DEBEN TRANSCURRIR ENTRE LA ÚLTIMA APLICACIÓN Y LA COSECHA.

2 INGREDIENTE ACTIVO

2.1 Contenido de Procloraz

Contenido declarado
450 g/L

Tolerancia permitida
±22.5 g/LZ

3 PROPIEDADES FÍSICAS

3.1 Estabilidad de la emulsión y reemulsificación (MT 36.3)

La formulación, una vez se diluida a 30 ± 2 °C con aguas estándar CIPAC A y D, deberá cumplir con lo siguiente:

Tiempo después de la dilución	Limites de estabilidad
0 h	Emulsificación inicial: completa
0.5 h	"crema", máximo: 0.4 mL
2.0 h	"crema", máximo: 1 mL
	"aceite libre": máximo: trazas
24 h	Reemulsificación: completa
24.5 h	"crema", máximo: 0.4 mL
	"aceite libre", máximo: 0 mL

Nota: en la aplicación del punto 36.3, las pruebas después de 24 h sólo son necesarias cuando los resultados después de 2 h de la dilución son dudosos.

4 ESTABILIDAD DE ALMACENAMIENTO

4.1 Estabilidad a 0 °C (CIPAC MT 39.3)

Después de un almacenamiento a 0 ± 2 °C durante 7 días, el volumen de sólido y/o líquido que se separa no será superior a 0.3 mL.

4.2 Estabilidad a temperatura elevada CIPAC MT 46.3)

Después de almacenar a 54 ± 2 °C durante 14 días, el contenido medio de ingrediente activo determinado no debe ser inferior al 95% con respecto al contenido medio determinado antes del almacenamiento y el producto seguirá cumpliendo con la especificación:

- Estabilidad de la emulsión y reemulsificación.

MÉTODO PARA PREPARAR Y APLICAR EL PRODUCTO

"Durante el manejo y aplicación de este producto, siempre utilice su equipo de protección personal indicado en la sección

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO. Para abrir el envase, quite la tapa de rosca y retire el sello de seguridad, evitando el contacto con la ropa, piel y ojos. Llene el tanque con agua a una tercera parte o a la mitad de su capacidad total. Agregue la cantidad necesaria de **TUCSON** de acuerdo a las dosis indicadas en esta etiqueta, adicione el resto de agua y agite el contenido con ayuda de un utensilio de madera o agitador destinado para tal fin, hasta que la mezcla sea homogénea. Es importante mantener la agitación durante la aplicación".

CONTRAINDICACIONES

No aplicar cuando el cultivo se encuentre bajo estrés. No aplicar con vientos mayores de 8 km/h para evitar la deriva del producto hacia cultivos o plantas susceptibles. No mezclar, almacenar ni aplicar este producto en tanques de acero galvanizado, excepto de acero inoxidable. No se aplique en horas de calor intenso, o de máxima insolación. No aplicar si se sospecha de la presencia de lluvia en las horas inmediatas a la aplicación.

FITOTOXICIDAD

No es fitotóxico a los cultivos aquí indicados si se utiliza de acuerdo a las dosis y recomendaciones de la etiqueta. Es fitotóxico para todas las plantas verdes y puede dañar a las especies que no son objeto de control, por lo que se debe evitar que la aspersión caiga sobre su cultivo o cultivos aledaños.

INCOMPATIBILIDAD

No se recomienda **TUCSON** en mezclas de tanque. Si se desea mezclar, la mezcla se hará con productos agroquímicos registrados en los cultivos recomendados en esta etiqueta, sin embargo, es necesario realizar una prueba de compatibilidad y fitotoxicidad previa a la aplicación.