



TYRON®

pimetrozina

Insecticida / gránulos dispersables en agua

RSCO-INAC-0102F-X0531-420-50.0

G

COMPOSICIÓN PORCENTUAL

% EN PESO

INGREDIENTE ACTIVO:

pimetrozina: (E)-4,5-dihidro-6-metil-4-(3-piridilmetilenamino)-1,2,4-triazin-3(2H)-ona
(Equivalente 500 g de i.a./Kg) 50.00%

INGREDIENTES INERTES:

Agente humectante, dispersantes, regulador de pH, agente de relleno 50.00%

TOTAL: 100.0%



“NOCIVO SI SE INHALA”

“ALTO LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”

“INSTRUCCIONES DE USO”

“SIEMPRE CALIBRE SU EQUIPO DE APLICACIÓN”

MODO DE ACCIÓN:

TYRON es un insecticida sistémico que actúa por contacto e ingestión. Actúa bloqueando las bombas salivares de los insectos plaga, como consecuencia del bloqueo de los comandos nerviosos. Una vez que **TYRON** entra en contacto con la plaga, ésta deja de alimentarse, muriendo de inanición.

MÉTODO PARA PREPARAR Y APLICAR EL PRODUCTO:

Durante la preparación y aplicación, use el equipo de protección personal completo: mascarilla de media cara con filtro de protección contra partículas y vapores, lentes de seguridad con protección lateral o careta protectora, camisa de manga larga de algodón y pantalón u overol de algodón, botas de neopreno y guantes de nitrilo.

Abra el empaque cuidadosamente, nunca abra el empaque con la boca. Para preparar el producto, realice una premezcla, en un recipiente con agua agregue la dosis de producto recomendada en esta etiqueta y agite hasta que los gránulos se hayan dispersado completamente; posteriormente, agregue el tanque de mezcla la mitad del volumen de aplicación vierta la premezcla en el tanque, adicione el resto de agua para completar el volumen de aplicación y agite hasta obtener una mezcla homogénea.

CULTIVOS, PLAGAS, DOSIS Y OBSERVACIONES DEL MODO DE USO:

CULTIVO	PLAGA	DOSIS G/HA	OBSERVACIONES
Berenjena, Chile, Jitomate (3) Papa (7)	Pulgón / <i>Myzus persicae</i>	300 – 400	Realizar dos aplicaciones foliares con un intervalo de 7 días, cuando se detecte la presencia de los primeros individuos; volumen de aplicación sugerido 350-450 L de agua /ha.
	Mosca blanca / <i>Bemisia tabaci</i>	400 – 600	Realizar 2 aplicaciones foliares a intervalo de 7 días cuando se detecte la presencia de la plaga; volumen de aplicación sugerido 379 – 479 L de agua /ha.
	Pulgón saltador / <i>Bactericera cockerelli</i>	700 – 900	Realizar 2 aplicaciones foliares a intervalo de 7 días cuando se detecte la presencia de la plaga; volumen de aplicación sugerido 398 – 498 L de agua / ha.
Calabacita, Chayote, Melón, Pepino, Sandía (3)	Mosca blanca / <i>Bemisia tabaci</i>	500 – 600	Realizar 2 aplicaciones foliares a intervalo de 7 días cuando se detecte la presencia de la plaga; volumen de aplicación sugerido 375 – 475 L de agua / ha.
	Pulgón / <i>Aphis gossypii</i>	200 – 400	Realizar dos aplicaciones con un intervalo de 7 días de manera foliar, cuando se detecten los primeros individuos vivos; volumen de aplicación sugerido 274 – 374 L de agua /ha.

Brócoli, Col Coliflor (7)	Pulgón / <i>Brevicoryne brassicae</i>	100 – 400	Realizar 2 aplicaciones foliares a intervalo de 7 días cuando se detecten los primeros individuos de la plaga; volumen de aplicación sugerido 325 – 425 L de agua /ha.
Nogal (14)	Pulgón amarillo / <i>Monellia caryella</i>	500 – 700	Realizar una aplicación foliar cuando se detecte la presencia de la plaga; volumen de aplicación sugerido 950 – 1050 L de agua / ha.
Papaya (1)	Mosca blanca / <i>Bemisia tabaci</i>	400 – 600	Realizar 2 aplicaciones foliares a intervalo de 7 días cuando se detecten los primeros individuos; volumen de aplicación sugerido 400 – 500 L de agua/ha.
Rosal1 Gladiolo1 Azalea1 (0)	Pulgón / <i>Macrosiphum rosae</i>	200 – 400	Realizar 2 aplicaciones foliares a intervalo de 7 días, iniciar cuando se detecten los primeros individuos de la plaga; volumen de aplicación sugerido 366-466 L de agua/ha.

1 Cultivo en condiciones de agricultura protegida.

() **Intervalo de Seguridad:** días que deben transcurrir entre la última aplicación y la cosecha.

Tiempo de reentrada: 12 horas.

CONTRAINDICACIONES:

No aplicar si hay vientos con velocidad mayor a 10km/h.

No aplicar sobre hojas húmedas o si hay amenaza de lluvia dentro de las 6 horas siguientes al tratamiento.

INCOMPATIBILIDAD:

No mezclar **TYRON** con otros productos. Si se desea mezclar, la mezcla se hará con productos registrados en los cultivos recomendados en esta etiqueta, sin embargo, es necesario realizar una prueba de compatibilidad y fitotoxicidad previa a la aplicación.

FITOTOXICIDAD:

TYRON no es fitotóxico en los cultivos y a las dosis aquí recomendadas. sin embargo, deberá aplicarse respetando las indicaciones de uso recomendadas en la etiqueta.