

FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO

PROVEEDOR: UPL AGRO S. A. DE C. V.

Datos Generales del Producto

Producto	UNIAMINA 480
Nombre común	2,4-D
Nombre químico	Sal dimetilamina del ácido 2, 4- Diclorofenoxiacético (con un contenido de ácido 2, 4-D, no menor de 83%).
Concentración	50.43 % Equivalente a 480g de l. A. por L
Tipo de formulación	Solución acuosa
Función	Herbicida
Grupo químico	Alquilclorofenoxi
Modo de acción	Sistémico
Registro	RSCO-HEDE-0222-417-013-050
Precauciones especiales	Toxico en caso de ingestión

Usos

UNIAMINA 480 es un herbicida formulado como solución acuosa. Se recomienda su uso para el control post-emergente de maleza de hoja ancha en los siguientes cultivos:

Cultivos	Maleza		Dosis (L / ha)	Instrucciones para su aplicación
	Nombre común	Nombre científico		
Arroz (SL)	Acahual	<i>Tithonia tubaeiformis</i>	1.5 - 2.0	Aplicar cuando las matas estén amacollando, pero antes del encañe.
	Bledo	<i>Amaranthus hybridus</i>		
	Cardo	<i>Cirsium arvense</i>		
Cebada (SL)	Diente de león	<i>Taraxacum officinale</i>	0.5 - 2.0	Aplicar cuando las matas estén amacollando, pero antes del encañe.
	Girasol	<i>Helianthus annus</i>		

Maíz (SL)	Lengua de vaca	<i>Rumex crispus</i>	2.0 - 3.0	En post-emergencia aplicar cuando el maíz tenga de 15 a 25 cm de altura. No aplique durante el Periodo de foliación del maíz.
	Malva	<i>Rumex crispus</i>		
	Mostaza	<i>Brassica campestris</i>		
Sorgo (SL)	Ortiga	<i>Urtica sp</i>	1.0 - 2.0	Aplicar cuando la planta tenga de 3 a 5 hojas de 1 y 20 cm. De altura y la maleza 5 cm. Cuando el sorgo tengas más de 5 hojas dirigir la aplicación de la maleza.
	Rabanillo	<i>Raphanus raphanistrum</i>		
Trigo (SL)	Tomatillo	<i>Physalis angulata</i>	0.5 - 2.0	Aplicar cuando las plantas estén amacollando, pero antes del encañe.
	Verdolaga	<i>Portulaca oleracea</i>		
() Intervalo de Seguridad: Días que deben transcurrir entre la última aplicación y la cosecha. SL: Sin Límite TIEMPO DE RE-ENTRADA A LAS ZONAS TRATADAS: 12 horas después de haber aplicado el producto.				

Método para preparar y aplicar el producto

Durante el manejo, preparación de la mezcla y la aplicación de UNIAMINA 480 siempre utilice equipo de protección completo para realizar con seguridad las operaciones (overol o camisa de manga larga y pantalón largo, mascarilla con respirador, lentes de seguridad, guantes y botas de neopreno). UNIAMINA 480 es completamente soluble en agua y de fácil aplicación, ya sea con aspersora de mochila o tractor. La cantidad de agua varía de acuerdo con el equipo.

Para obtener mejores resultados, úsese la cantidad de agua suficiente para lograr un buen cubrimiento de la maleza existente preferentemente cuando este en crecimiento activo, es decir post-emergencia temprana. El equipo que utilice para las aplicaciones del herbicida debe reservarlo exclusivamente para este propósito. Llene el recipiente del equipo de aplicación siempre a favor del viento y con el equipo de protección puesto, del mismo modo haga las aspersiones.

En general, para preparar la mezcla, se puede utilizar de 200 a 400 litros de agua en aplicaciones terrestres.

Signos y síntomas de intoxicación

En caso de que el producto sea ingerido, puede causar quemaduras en la boca, esófago y estómago, así como irritación de ojos, nariz y garganta. En casos severos produce vértigo, dolor de cabeza, debilidad y dolores musculares.

Tratamiento y antídoto específico

No hay antídoto específico. Se recomienda dar tratamiento sintomático y de sostén.